

※ 의약품은 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
 ※ 의약품은 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

고단위 종합영양제

엘바민 정

Elbamin Tab.

일반의약품

분류번호:종합대사성제제(03980)

【원료약품의 분량】 1정 중

로알젤리 (생규)	20.0 밀리그램
(10-히드록시-2-데세노인산으로 0.8밀리그램)	
토코페롤아세테이트 2배산 (KP)	90.0 밀리그램
(비타민E로서 45IU)	
제피아스코르브산 (별규)	103.1 밀리그램
(아스코르브산으로서 100밀리그램)	
티아민질산염 (KP)	9.0 밀리그램
리보플라빈 (KP)	2.0 밀리그램
니코틴산아미드 (KP)	40.0 밀리그램
피리독신염산염 (KP)	5.0 밀리그램
시아노코발라민 (KP)	12.0 마이크로그램
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)	
첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크	

【성 상】

황색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨, 목걸림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 경우의 비타민(B1, B2, B6, C, E)의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력 저하시, 노년기
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨걸림) 등)
- 각기
- 눈의 피로

【용법·용량】

1회 1정, 1일 1-3회 복용

【사용상의 주의사항】

- 경고

로알젤리가 함유된 제제 사용으로 인하여 천식 및 심각한 알레르기 증상 등의 부작용이 나타났다는 외국의 보고가 있으므로 천식 및 알레르기 환자는 복용하지 말 것.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1세 미만의 영아
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 과수산노증환자
 - 임부, 수유부

5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 이상반응

- 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은변
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가 될 수 있다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상이 나타날 수 있다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10㎍ 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상, 과요산혈증, 간손상을 일으킬 수 있다.

5. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지킨다
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다.

6. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다 : 레보도파

7. 임상검사치에의 영향

- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭달아) 보관한다.
- 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저 장 방 법】

기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관

【포 장 단 위】

자사 포장단위

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-2206-3800 에서 확인 할 수 있음.
- ※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품 용어설명 및 정보는 "온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조"

제조발매원

조당약품공업(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 381
 소비자 상담전화 : 080-302-3000

문서작성년월일 : 2003.07.28

문서개정년월일 : 2015.11.24