

GC 녹십자

주성분 함량 2배 증가! 청량감 강화!

제놀 탭에스

케토프로펜 카타플라스마

5매



약물층
살구색 밀착포
투명비닐막

1 별도의 밀착포가 필요없는
일체형
살구색 습포제

테니스
엘보우

상완
골염

상과염

근육통

초기통증까지 잡아주는
시원한 관절염 치료

비닐지퍼
교차부분부터 눌러서 밀폐하여 주십시오.

비닐지퍼
교차부분부터 눌러서 밀폐하여 주십시오.

주성분 함량 2배 증가! 청량감 강화!

제놀 탭에스 케토프로펜 카타플라스마

일반의약품
분류번호 264

일반의약품 정보

[유효성분] 1매 (8 X 12cm, 6.8g) 중
케토프로펜 (KP) 41.14 mg

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통·소염·항염·퇴행성관절염·관절염, 어깨 관절주위염, 건협·건초염, 협관염·관절염, 건협관염·관절염, 상완골·상과염 (테니스 엘보우 등), 근육통, 외상성치후의 통증·부기·동통·통증

[용법·용량] 약면의 피부부를 떼어낸 후 환부(질환 부위)에 1일 2회 부착하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 않습니다.
1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식·비스테로이드성 소염제(전통제 등)에 의한 천식발작의 유발 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다) 3) 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 베타피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있습니다) 4) 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 컷트에 이 약을 경구투여한 실험에서 태아의 동맥혈관수축이 보고되었습니다. 임신후기에 투여경구, 주사, 직접근경직자주입시 지속성 태아 순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다. 5) 15세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 가려운 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 임부 또는 수유부 (안전성이 확인되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피하십시오)
- 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상습적 알러지 반응이 있을 경우에도 주의하십시오.
1) 드물게 속, 아·복막염 증상·두드러기, 호흡 곤란, 열감·부기 등 과민성·중증에 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 간접 흡연(담배·담배 연기)을 피하십시오. 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다. 3) 피부 : 때때로 발적·종창·발진, 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 통증·부기 등의 접촉피부염, 피부 건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 직사광선·외상에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부 발진이 전신으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지하십시오. 4) 1주일 정도 사용하고 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
1) 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이 야외활동을 피하고 일상 생활 때에는 이 약의 도포부위를 옷, 스카프, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 흰색이나 밝은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 우체 옷을 입습니다(자외선에 의해 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있습니다). 2) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다. 3) 피부부전증을 드러내지 않게 할 수 있으므로 검역을 선택하는 염색에 사용하는 경우에는 적절한 향균제 또는 향균소독제(제)를 병용하여 사용하고 충분히 관리를 하여 감염을 예방하십시오. 4) 만성관절염·퇴행성관절염·관절염 등에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하십시오. 또한 성질을 충분히 관찰하여 이상반응에 유의하십시오. 5) 눈 및 점막에는 사용하지 않습니다. 6) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 발진·가려움·통증을 일으킬 수 있으므로 사용시

주의하십시오. 고무줄, 백선 등에는 사용하지 않습니다. 8) 밀봉봉대를 사용하지 않습니다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 5매

[사용기한] 제품 뒷면 하단 표시일까지

[참가제] · 참가제 (동물유래성분) : 젤라틴 (소, 돼지) · 기타 참가제 : L-멘톨, 건조소식한류아닐린, 글리세린, N-톨, TS-620, 디부틸하이드록시메틸렌 라일락S-366, 미리스티신아스프로필, 말초부, 부조부, 산화티, 소르비탄세스쿠올레이트, 실리코니, 이소도데실스테아레이트, 에디티나, 트롬복산, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스, 나트륨, 카올린, 크로타민, 타르타르산, 폴리비닐알코올, 폴리크릴레이트, 폴리크릴산, 나트륨

[성상] 미백색의 점착성 고체를 부직포상에 도포한 방향성을 가진 카타플라스마제로서 밀착포가 접합되어 있습니다.

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 하기사항을 요약한 것으로 사용 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오.

- ※ 부작용 보고 : 한국약물안전관리원(1644-6223)
- ※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 상기 표시사항 중 작성일자 (2018년 5월 15일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencross.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

[안전한 사용법]

- 사용 전에 설명서를 상세히 읽어 보시고 효능, 효과상에 기재된 용도 이외에 임의대로 제품을 부착하지 않습니다.
- 절단부위를 깨끗이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
- 목과 같이 안전한 부위나 피부 또는 모발이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 물려서 떼어 내십시오.
- 피부 알러지 반응을 위하여 등압부위에 연속적으로 사용하는 것은 피하십시오. 가려움증이나 발적, 발진이 나타날 경우 사용을 중지하고, 환부를 흐르는 찬물에 담가 주십시오.
- 시우나, 온열질환에는 피부가열이 악화되고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하십시오.
- 피부에 이상 증상이 생겼을 때에는 끊거나 손대지 말고 즉시 의사 또는 약사와 상담하십시오.

제조판매사
GC 녹십자
(주) 녹십자
충북 음성군 금왕읍 무극로66번길 26
TEL. 031-260-9300
소비자상담실 TEL. 080-260-0033

제조
번호
OTHER
사용
기한

인쇄크기 40x18mm
인쇄시 적색 문구, 박스 삭제해주세요.