




10매입



빠르고 강력한, 붙이는 항염진통제
프로디펜
첩부제 (플루르비프로펜)

- 관절염
- 근육통
- 외상 후 통증



분류번호 : 264 (진통, 진양, 수렴, 소염제) **[일반의약품]**

원료약품의 분량 (1매 10X7cm², 1.15g중) 플루르비프로펜(KP)20mg

성상 : 미황색의 점착성물질을 살구색 린트포상에 도포하여 점착면에 박리지를 덮은 첩부제

효능·효과

다음 질환 및 증상의 진통, 소염(항염) : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄)·건초염(힘줄윤활막염), 상완골(위팔뼈)상과염(테니스엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창(부기)·동통(통증)

용법·용량 : 약면의 박리지를 떼어낸 후 1일 2회 환부(질환부위)에 부착합니다.

사용상의 주의사항

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자는 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 기타의 플루르비 프로펜 제제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 전식(비스테로이드성 소염(항염) 진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다.)

2. 다음 환자에는 신중히 사용하십시오 : 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다.)

3. 부작용

- 1) 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 약진(약물발진), 가려움 및 적열감(화끈감), 접촉피부염이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.
- 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거림), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다. 천식발작은 이 약의 부착 후 수 시간 내에 나타납니다.

4. 일반적주의

- 1) 소염(항염) 진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의합니다. 2) 피부감염증을 불현성(증상이 나타나지 않는)화 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 복용)하고 충분히 관찰하여 신중히 사용합니다. 3) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려합니다. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄)에 유의합니다.

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돈다)한다고 판단될 경우에만 사용합니다.

6. 소아에 대한 투여 : 소아에는 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).

7. 고령자(노인)에 대한 투여 : 고령자(노인)에는 이 약의 부착 부위의 피부상태에 주의하며 신중히 사용합니다.

8. 적용상의 주의 : 1) 손상된 피부와 점막에는 사용하지 않습니다. 2) 습진 또는 발진부위에는 사용하지 않습니다. 3) 적용부위의 땀을 닦아낸 후 사용합니다.

저장방법 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

· 이 문안은 2013년 11월 27일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

<안전사용수칙>

1. 건조하거나 약간 피부에 부착하신 경우에는 땀 때 미온수에 적당히 불려서 떼내시면 좋습니다.
2. 햇볕에 노출되는 부위에 부착하신 경우에는 봉대나 의복 등으로 부착 부위를 가려주시면 광과민성으로 인한 피부 이상 반응을 예방할 수 있습니다.
3. 동일부위에 연속적으로 사용하지는 것은 피하시는 것이 좋습니다.
4. 사우나, 온찜질 전후에는 피부 각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품을 부착하실 때 주의하십시오.

제조사 : (주)녹십자

충북 음성군 금강읍 무곡로 65번길 26

※프로디펜(10)-5131122

제조의뢰자 : **ILDONG 일동제약**

경기도 안성시 공단로 25 www.ildong.com

소비자상담실 : 080-022-1010



0108806429124427