

항히스타민제

씨노스정

CINOSE Tab.

전문 의약품

분류번호 : 01410

■원료약품 및 분량: 1정 중

- 유효성분: 세티리진염산염(BP) - 5mg
- 수도에페드린염산염(USP) - 120mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 포비돈, 폴리비닐피롤리돈6000, 옥수수전분, 에틸셀룰로오스, 크로스보비돈, 디에틸프탈레이트, 히프로멜로오스2910, 카르나우바남

■성상: 흰색의 원형 필름코팅정

■효능·효과

다음 증상을 수반하는 계절성 및 다년성 알레르기 비염의 완화: 코막힘, 재채기, 콧물, 눈 및 코의 소양증

■용법·용량

- 12세 이상의 소아와 성인
식사와 관계없이 1회 1정씩 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다.
이 약은 씹거나 부수어서 복용하지 말고 그대로 삼켜서 복용한다.
- 이 약은 2~3주 이상 복용하지 않도록 한다.
- 신기능 저하 환자 및 간기능 저하 환자의 경우 감량하여 1회 1정씩 1일 1회 복용한다.

■사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 또는 ephedrine 또는 piperazine류에 과민증이 있는 환자
2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상 동맥질환 환자
3) MAO(monoamine oxidase) 저해제를 투여 중이거나 2주 이내에 투여한 환자
4) 안내압이 증가되어 있거나 녹내장, 녹내장이 있는 환자
5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) MAO(monoamine oxidase)저해제, β_2 -교감신경 효능 억제제는 교감신경양 작용을 증가시킨다. MAO저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제 투여 최소 15일 후 이 약을 복용한다.
- 2) 교감신경양 아민은 methyl dopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소시킨다.
- 3) 수도에페드린을 디기탈리스와 병용 투여할 때 전위성 심박 조율기의 활성이 증가될 수 있다.
- 4) 수도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수속도가 감소된다.
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
1) 운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요한다.
2) 이 약에 함유되어 있는 세티리진과 수도에페드린은 모두로 분비되므로 이 약을 복용하는 동안 수유하거나 수유하는 동안 이 약을 복용해서는 안된다.
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것

- 1) 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 고혈압, 빈맥, 부정맥, 허혈성 심질환, 신장 및 간기능 부전환자, 노인
- 2) 교감신경양 약물(비총합 제제, 식욕억제제, amphetamine 등의 정신흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투

여 받는 환자

- 3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여받는 환자
- 4) 알코올 또는 기타 중추신경억제제를 투여받는 환자
- 5) 임신부나 임신하고 있을 가능성이 있는 사람 또는 수유부: 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 임신 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
1) 구갈, 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈맥, 신경과민증, 어지러움, 현훈, 오심
2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전, 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈
3) 피부반응, 혈관부종 등의 과민반응
4) 본제를 복용한 후에도 증상이 개선이 없는 경우
6. 과량 투여시의 처치
과량 투여 시 빈맥, 부정맥, 고혈압, 중추신경억제효과(진전, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자궁효과(불면, 환각, 진전, 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적인 방법을 취하도록 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈맥은 β -억제약으로 조절한다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥투여한다.
7. 저장상의 주의사항

7. 기밀용기, 상온(15~25℃)에 보관하고 다음 사항을 주의하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■사용기간: 제조일로부터 36개월

■포장단위: 30정/병, 200정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 070-4346-1213으로 하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어 보아 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정연월일: 2017년 09월 27일

■제조사: (주)넥스팜코리아
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41