붙이는 관절염 치료제

제놀골드 플라스타 [케토프로펜]

일반의약품

분류번호 264

일반의약품 정보

[유효성분] 1매(7 X 10㎠, 1.135g) 중

케토프로펜 (KP) ······························· 30 mg

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통·소염[항염] : 퇴행성 관절염 (골관절염), 어깨관절 주위염, 건[힘줄]·건초염[힘줄윤활막염], 건[힘줄]주위염, 상완골[위팔뼈]상과염(테니스엘보우 등), 근육통, 외상[상처]후의 종창[부기]·동통[통증]

[용법·용량] 약면의 박리[벗겨짐]지를 떼어낸 후 환부[질환 부위]에 1일 2회 부착하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염[항염]진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다) 3) 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 베자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있습니다) 4) 임신 기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 랫트에 이 약을 경구투여한 실험에서 태자의 동맥혈관수축이 보고되었습니다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장[곧창자]주입)시 지속성 태아 순환 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다. 5) 15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부 또는 수유부 (안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용은 피합니다)

3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 드물게 쇽, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음[거품소리], 천명[숨을 쌕쌕거림], 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다. 3) 피부 : 때때로 발적[충혈 되어 붉어짐], 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 종창[부기] 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 직사일광(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지하십시오. 4) 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

1) 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입습니다(자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있습니다) 2) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다. 3) 피부감염증을 드러나지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균[곰팡이]제를 병용[함께 사용]하고 충분히 관찰하여 부작용 발현[드러냄]에 유의하십시오. 4) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하십시오. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의하십시오. 5) 눈 및 점막에는 사용하지 마십시오. 6) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의하십시오. 7) 무좀, 백선 등에는 사용하지 마십시오. 8) 밀봉붕대법을 사용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[저장방법] 차광한 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10매

[사용기한] 제품 뒷면 하단 표시일까지

[첨가제] •기타 첨가제 : L-멘톨, 디부틸히드록시톨루엔, 린트포, 박리지, 소르비탄올레에이트, 아크릴계 점착용액(아크릴계점착제로서 297.5 mg), 토코페롤아세테이트, 폴리에틸렌글리콜4000

[성상] 미황색의 점착성 물질을 살구색 린트포상에 도포하여 점착면에 박리지를 덮은 첩부제입니다.

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 사용 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 상기 표기사항 중 작성일자(2018년 5월 15일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencross.com) 나 소비자상담실 080-260-0033로 문의하시기 바랍니다.

[안전한 사용방법]

- 사용 전에 설명서를 상세히 읽어 보시고 효능, 효과상에 기재된 용도 이외에 임의대로 제품을 부착하지 마십시오.
- 목과 같이 연약한 부위나 피부 또는 모발이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼어내십시오.
- 피부 알러지 방지를 위하여 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 피해주시고 가려움증이나 발적, 발진이 나타날 경우 사용을 중지하고, 환부를 흐르는 찬물에 담가주십시오.
- 샤워나, 온찜질 전후에는 피부각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하십시오.
- 피부에 이상 증상이 생겼을 때에는 긁거나 손대지 말고 즉시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

제조판매자

GC 녹십자

(주)녹십자
충청북도 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL. 031)260-9300 소비자상담실 TEL.080-260-0033

(01)08806436014749

제조번호

사용기한

인쇄크기 40x18mm

인쇄시 적색 문구, 박스 삭제해주세요.

비닐류 OTHER

호일-30-4106-4

GC 녹십자

붙이는 관절염 치료제

제놀 골드

플라스타 [케토프로펜]

10매

8 806436 014749

퇴행성 관절염

어깨관절 주위염

골관절염

테니스 엘보우