

엘시콤 정

(ELCICOM Tab.)



UNIMED

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

엘-시스틴(B.P) ······ 500mg
 피리독신염산염(K.P) ······ 50mg

■ 성상 : 황색의 장방형필름코팅정

■ 효능·효과

- ◎ 피부과 : 부서지기 쉬운 모발, 손톱·발톱의 성장 및 영양장해
- ◎ 안과 : 각막의 상처치료 보조

■ 용법·용량 : 성인 1일 4정을 식사중 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 중증 신기능장애 및 간성혼수
- 2) 시스틴뇨증인 경우는 신중히 투여할 것
- 3) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 복용시 다음사항에 주의할 것

- 1) 때때로 구역, 드물게 설사, 식욕부진, 구갈(목마름), 가벼운 복통, 복부팽만감 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 정해진 용법·용량을 지킬 것

3. 상호작용

레보도파와 병용 투여시 비타민 B6(피리독신)에 의한 억제 작용이 있으므로 병용투여하지 말 것

4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것

- 1 개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 30정, 1000정

작성년월일 : 2010. 03. 04

※ 본 제품의 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손되었을 경우에는 약국 및 판매상을 통하여 교환해 드립니다.
 ※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

• 서울 송파구 잠실본동 250-8 유니메드빌딩 / Tel : (02)2240-5100 ☎ 고객센터 : 080-500-5100
 • 공장 : 충남 아산시 신탐동 251번지 • 홈페이지 : <http://www.unimed.co.kr>

UM010310