

염증완화제

인플라젠

INFLA Tab.

일반 의약품

분류번호:03950

■ 원료약품 및 분량: 1정 중

- 유효성분: 브로멜라인(20,000브로멜라인단위)(KP) - 40mg
- 결정트립신(2,500USP트립신단위)(USP) - 1mg
- 첨가제(동물유래성분): 결정트립신(포유동물, 채장), 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제: 옥수수전분, 폴리메틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스2910, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 산화티탄, 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성 상: 흰색의 원형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화: 수술 및 외상(상처) 후, 유증음체(잇몸)

■ 용법 · 용량

성인: 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.

체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈액응고이상 환자

2) 심한 간장애 또는 신장애(신장장애) 환자

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우울, 우울다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)

4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용)투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 과민반응: 발진, 발적(홍충되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 소화기계: 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 혈액계: 드물게 코피, 혈액개래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법 · 용량을 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

■ 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 사용기간: 제조일로부터 36개월

■ 포장단위: 10정/PTP

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화070-4346-1213으로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정연월일 : 2017년 10월 30일

■ 제조자: (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

■ 판매자: 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

