정부공인 KGMP 우수의약품 적격업체

일반의약품
분류번호 : 319

코엔큐 연질캡슐

CO&Q

코엔자임Q10이 함유된 종합 항산화영양제

코엔큐(Co&Q)연질캡슐은 대표적 항산화성분인 β-카로틴, 비타민C(아스코르브산), 토코페롤, 셀레늄, 아연 및 코엔자임Q10(유비데카레논)이 이상적으로 배합된 항산화영양제입니다. 특히 코엔자임Q10은 체내 존재하는 성분으로 강력한 항산화물질인 동시에 체내 에너지원 생성에 중요한 물질이며 최근 일본, 미국, 등에서 새로운 항산화물질로서 각광받고 있습니다. 또한 코엔자임Q10은 인체 내 정상적인 심장기능을 유지하는 기능 등 여러가지 생리기능에 관여를 하고있는 중요한 항산화 영양성분입니다.

항산화작용이란?

우리 몸에서는 호흡같은 정상적인 생리현상과정과 외부 환경에 의해서 불가피하게 유리기(free radical) 라는 유해물질이 생성됩니다. 유리기는 체내 세포를 손상시키는 독성이 있어 노화, 혈액순환장애, 당뇨, 암, 자가면역질환, 알레르기 등의 원인이 된다고 알려져 있습니다. 이러한 유리기를 제거하는 것을 항산화작용이라고 합니다. 우리 몸에는 유리기를 제거할 수 있는 항산화 방어기전이 있지만 나이가 들수록 또는 질병상태에 따라 약해지므로 충분한 항산화효과를 위해서는 외부로부터 항산화물질을 공급해주는 것이 좋습니다. 대표적인 항산화물질로는 β-카로틴, 비타민C, 토코페롤, 셀레늄, 아연, 코엔자임Q10 등이 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

β-카로틴 현탁액30% (KP) ····· 10mg
(β-카로틴으로서 3mg)
토코페롤아세테이트 (KP) ····· 200mg
(토코페롤로서 200 I.U)
아스코르브산 (KP) ····· 500mg
셀레늄가루0.1% (KP) ····· 25mg
(셀레늄으로서 25㎍)
유비데카레논 (KP) ····· 5mg
산화아연 (USP) ····· 17.43mg
(아연으로서 14mg)
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호
첨가제(동물유래) : 숙신산젤라틴(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 가죽)

【성상】

적갈색의 내용물을 함유한 암적색(검붉은 색)의 연질캡슐제(TG CQ)

【효능 · 효과】

1.다음 경우의 비타민 A,C,E의 보급
- 육체피로, 임신 • 수유기, 병중 • 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기
- 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
- 햇빛 • 피부병 등에 의한 색소침착(기미,주근깨)완화, 잇몸출혈 • 비출혈(코피)예방
- 말초혈행(혈액)장해 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 • 목결림, 수족(손발)저림 • 수족냉증(손발이 차가움)

2. 아연의 보급

【용법 · 용량】

성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고
임부에 비타민A(레티놀)을 1일 5,000 I.U. 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000 I.U./일 이상 투여하지 않는다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것).
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
3) 임부, 수유부
4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
5) 신장애(신장장애) 환자
6) 저단백혈증 환자
7) 위장관(위창자)질환 환자
8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 부작용(이상반응)
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 구역, 구토, 설사, 변비, 위부불쾌감, 위장관(위창자) 장애, 소화장애, 상복부통증, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 저혈압, 폐부종(폐부기)
2) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용(먹는)피임약을 투여하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자에 비타민E를 투여할 경우에는 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용
1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
: 인산염, 칼슘염, 경구용(먹는) 테트라사이클린계 제제, 제산제
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 임부에 대한 투여
외국에서 임신전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경류 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8. 임상 검사치에의 영향
각종 뇨검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

9. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
3) 오용(잘못 사용)남용을 피하고, 품질의 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 60캡슐 (10캡슐×6), 120캡슐 ((10캡슐×6)×2) / PTP

*본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
* 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(http://www.taiguk.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 02. 07

제조의뢰자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎소비자상담전화 080-300-8282

제조자
서흥
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61