

※본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 이이드락(<http://ezdrug.kida.go.kr>) <정보
미당> (의약품동종서)에서 확인할 수 있습니다. 개정일: 2009.12.31

포장단위: 자사포장단위 (주와-부작용) 저장방법: 기밀봉지, 실온(1~30℃)보관
☎소비자 상담실: (031)672-3431, www.miraepharmkorea.co.kr
제조원: 미래제약주식회사, 경기도 안성시 신소현동 137번지
판매원: 한미메디칼(주), 서울시 송파구 방이2동 48-9

일반 의약품
분류번호: 01140

정부 공인
KGMP
우수의약품 지정업체

Hanmi

효과빠른 종합감기약

바로콜-S (캡슐)

BAROCOL-S

10캡슐

콧물 · 코막힘

재채기 · 인후통

기침 · 가래

오한 · 발열

원료약품 및 그 분량: 1캡슐(400mg) 중
아세트아미노펜(약전) 200mg
d-클로르페니라민말염(신염약전) 0.58mg
클로페라стин염(신약전) 8mg
dl-메틸에페드린염(신염약전) 10mg
gua이아솔론산칼륨(약전) 41.6mg
카페인무수물(약전) 12.5mg
염화리조신(식약청고시) 10mg(약가)

티아민질산염(약전) 4.1mg
리보플라빈(약전) 2mg
아스코르빈산(약전) 10mg
동물유래성분: 유당수화물(기밀동물소, 사용부위유)

성상: 미황색연노랑 분말이 충전된 상부 주형상 하부 미황색연노랑의 경질캡슐제
효능·효과: 감기의 제증상콧물, 코막힘, 재채기, 인후통(목구멍 통증), 기침, 가래,
오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화
용법·용량: 성인(15세 이상) 1회 2캡슐, 1일 3회 식후 30분 이내에 복용한다.
사용상의 주의사항

1. 경고: 매일 저전 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제
를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의할 것. 이러한 사람이 이 약을 복
용하면 간 손상이 유발될 수 있다.
2. 다음 환자에게 투여하지 말 것. 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자. 2) 난백
알레르기 환자. 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성
(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase
deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose
malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다. 3. 다음
사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것. 1) 본인 양친 또는 형제 등이 아토피
피부염, 기관지천식, 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 알레르기성 코염,
편두통, 약물 알레르기, 식물 알레르기 등의 알레르기성 소인이 있는 환자. 2) 지름
까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등
을 일으킨 적이 있는 사람. 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심
되는 영아(갓난아기) · 유아 및 14세 이하의 어린이. 4) 간장, 신장(콩팥), 간상선질
환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람. 5) 심장
에 장애가 있는 사람 또는 고혈압노인. 6) 뇌나장: 뇌의 동통(통증), 눈이 침침
함 등이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람. 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있
는 부인, 수유부. 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람. 4. 복용할 때에는
다음 사항을 주의할 것. 1) 용법 · 용량을 잘 지킨다. 2) 다음 약들과는 동시에 복용
하지 말 것(진해거담제, 기침약, 가래약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 정
제 등) 3) 어린이에게 복용시킬 경우 보호자의 책임하에 복용시킬 것. 4) 3개월 미
만의 유아에게는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우에도 1세 미만의 유아에게는 부

득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다. 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다
음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시
복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. ①이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종
(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축(손발)이 차가
워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우. ②고열을 수반하여 발진, 발적(충혈되어 붉어
짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신(피부, 입 및 눈의 점막)에 나타난 경우. ③천
식이 나타난 경우: 바로콜-S에 의해, 심한 경우 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의
아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬
수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다. 5. 복용 중 또
는 복용 후에는 다음 사항을 주의한다. 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구
역, 구토, 식욕부진, 배뇨곤란, 헛기름(어지러움), 변비 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하
고 의사, 약사와 상의한다. 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전
또는 기계류의 운전조작은 피한다. 3)여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복
용을 중지하고 의사, 약사와 상의한다. 4)장기간 연용(계속 복용)하지 않는다. 6. 부작용
1) 속쓰림: 드물게 속쓰림이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 연(얼굴)창백, 사
자강(팔다리) 천근근, 혈압강하, 창백증, 의식불명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고
적절히 처치한다. 2) 과민증: 때때로 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으
므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 3) 소화기계: 설사, 때때로 식욕부
진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 드물게 구내염(입안염) 등이 나타날 수 있다. 4) 피부:
스티븐스-존슨증후군(피부정맥안종후군), 리델증후군(중독성피부괴사증)이 나타날 수 있으
므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안홍증, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되
는 경우 및 고열을 동반하는 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상성의 수포 등의 중증심한
증상의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고
의사 또는 약사와 상의한다. 7. 저장상의 주의사항: 어린이의 손이 닿지 않는 정
소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.