

두스카 정

【원료약품의 분량】 1정 중

수산화마그네슘(KP)	500mg
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
노화엑스(BP)	100mg
(히드록시안트라센유도체(바발로인)으로서 20.0mg)	

【성 상】

흰색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회, 11세~14세 1일 2회를 식전(식간 또는 식후)에 복용한다.
복용 간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회(처음복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 급성 복부질환(충수(맹장괴리)염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색(창자막힘) 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 3) 신장애(신장 장애) 환자
 - 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 부작용
이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
 - 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 소아에 대한 투여
 - 1) 이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)) 보관한다.
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 500정

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서를 약과 함께 보관 하십시오.
- * 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은(02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- * 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 : 2014. 05. 16.

제조·판매

NIELSON

한국넬슨제약

충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

소비자 상담실 (02)588-0941