

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 홍화유(USP) 333.33 mg
 토코페롤아세테이트(KP) 6.67 mg
 피리독신염산염(KP) 0.67 mg
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 0.048 mg
 파라옥시벤조산프로필 0.012 mg
- 첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호, 청색1호
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가죽)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, D-소르비톨액, 레시틴, 산화티탄, 에틸바닐린, 백납, 팜유

[성 상] 미황색의 내용물이 든 일면 연녹색 일면 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 비만증, 당뇨병·본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선

[용법·용량] 1일 3회, 1회 3캡슐을 식전 30분 전에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 구성 성분에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자 3) 파킨슨병 치료제인 "레보도파"성분의 의약품을 이 약을 함께 복용하는 경우에는 피리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 탈탄산화를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약될 수 있으므로 이 약과 함께 사용 시 신중히 투여한다. 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용 1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다. 2) 피부 : 발진, 발적이 나타날 수 있다. 3) 이약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나, 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는

일반 의약품
 분류번호 : 218

비만증, 지질대사 개선제

리나민 연질캡슐

(홍화유/토코페롤아세테이트/피리독신염산염)

300캡슐

의약품 설명서

(주)레고켐제약
 LegoChemPharma

혈전성 소인이 있는 환자에 이 약에 함유된 비타민E를 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 5) 이 약에 함유된 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

5. 보관 및 취급상의 주의 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것 3) 오염을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기와 교체하지 말 것

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 작성일 : 2017.10. 25. (Rev.0)

제조번호 :

사용기한 :

55*15mm