


고단위 종합 비타민 및 미네랄 보충

뉴트리비타에프

영양
보충



비타민은 건강유지, 질병 예방, 발육·성장 및 각종 신체 대사와 기능에 필수적인 성분이며, 미량으로도 탁월한 효과를 가지는 성분입니다. 이러한 비타민은 체내에서 합성이 되지 않으므로 섭취를 통해서만 보충해 주어야 하는데, 현대인은 불규칙적인 식생활, 인스턴트 식품, 다이어트 등의 잘못된 식습관 등으로 비타민을 충분히 공급 받지 못하여 만성피로, 신체 대사 이상 등에 시달리고 있습니다. 뉴트리비타에프 영양보충제는 비타민 10여 종과 미네랄 6종으로 처방된 알타비타민제로 과다한 업무와 스트레스에 시달리는 현대인 뿐 아니라 수험생, 수유기와 여성, 노년기까지 남녀노소에 관계없이, 꼭 필요한 영양소를 공급해드립니다. 또한 영양결핍 예방으로 비타민의 산화를 방지하여, 높은 흡수율과 빠른 효과를 낼 수 있는 제품입니다.

(원료명 및 함량) 1캡슐(330mg) 중	
레티놀(비타민A)로서 2,400 IU(KP)	1,412mg
콜레스테롤(비타민D)로서 240 IU(KP)	0.24mg
토코페롤(비타민E)로서 10 IU(KP)	10.0mg
타이민(비타민B1)	2.5mg
리보플라빈(비타민B2)	2.5mg
0.1% 시아노코발라민(비타민B12)으로서 4.9μg(KP)	4.9mg
아스코르브산(비타민C)	55.0mg
파리독신(비타민B6)	1.0mg
니코틴산(비타민B3)	20.0mg
판토텐산(비타민B5)	30.0mg
우수인산수소칼슘(비타민D3)	100.0mg
(인으로서 22.7mg, 칼슘으로서 29.46mg, 총칼슘으로서 31.96mg)	
산화마그네슘(비타민D3)으로서 6.03mg(KP)	10.0mg
산화제이(비타민D3)로서 0.78mg(KP)	1.0mg
황보산(비타민D3)로서 0.65mg(KP)	2.0mg
신생아(비타민D3)로서 4.02mg(KP)	5.0mg
간조황산(비타민D3)로서 10.62mg(KP)	33.0mg
마늘엑스(비타민D3)로서 0.2mg	0.2mg
감마오리자놀(비타민D3)로서 0.5mg	0.5mg
파라옥시벤조산(비타민D3)로서 0.6mg	0.6mg
헥사메틸렌(비타민D3)로서 0.15mg	0.15mg

[성분] 황보산의 내용물을 함유한 알타비타민의 정제된 영양보충제

[효과·효과]

1. 각종 영양의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보충

- 육체피로
- 수유기
- 병중·병후의 체력 저하
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 눈의 건조증 완화, 야맹증
- 뼈·이의 발육, 구루병의 예방
- 3. 혈 결핍증의 예방 및 치료

[용법·용량] 12세 이상 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐을 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경 고

1) 일부에 비타민(비타민)을 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 신장성 기혈을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 여성은 비타민(비타민)을 5,000 IU/일 이상 투여하지 않습니다. (비타민A 결핍증 환자는 제외) 2) 월경주기는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia): 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민성이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아
- 4) 황산염
- 5) 황산염(황산)보다 이상으로 많이 간장, 해장을 침착하는 질환, 헤르페스, 전신성 홍반, 비결핵성 결핵
- 6) 신장성 환자
- 7) 중증의 신장성 환자
- 8) 일부

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 3) 과산화수소증(hyperoxaluria): 뇨 중에 과량의 수산염이 배출되는 상태
- 4) 수유부
- 5) 소화성 궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 6) 담낭관염, 간질환 환자
- 7) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 8) 신장장애 환자
- 9) 재간헐성 환자
- 10) 간담관염을 투여 중인 환자

4. 이상반응

1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- ① 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사
- ② 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은변, 저혈압, 알콜성마비, 심박동불규칙, 구역질, 마비발진
- ③ 두드러기, 광선과민성, 복부·위 통증, 경련, 혼수, 열, 삼핵세포증, 혼란
- ④ 부전수축, 중추신경계 기능 저하, 위장관 장애, 소화장애, 복부증
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리나 애정보다 빨리되거나 많이 정정 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가할 수 있습니다.
- 4) 장기간 과용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증후군(neuropathy): 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화가 나타날 수 있습니다.
- 6) 불산이 부족한 환자에게 비타민D를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 과잉혈당(hyperursemia): 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 약제투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 알레르기 주의

- 1) 정제된 용액·용량을 잘 지켜주세요.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 하십시오.

6. 상호작용

- 1) 항암도르테린, 트라임타렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
 - ① 인산염, 칼슘염, 경구용트라이아몰린계 제제, 제산제
 - ② 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.

7. 일부·수유부에 대한 투여

- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부 신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증기가 추정되는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 없는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 하십시오.
- 2) 비타민D는 모유로 분비되어 산생아에게 과잉칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

8. 임상검사상의 영향

- 1) 각종 뇨검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사자에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 자광선상 피하고 밀 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보존하십시오.
- 3) 외·냉장을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(30℃)

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 100캡슐, 200캡슐

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2009년 4월) 이후 변경된 내용은 이지드레(http://ezdrug.kids.go.kr/kids20에서 확인하실 수 있습니다).
- 소비자상담실: 02-586-0051 • 반응 및 고충처: 02-583-1882

발행처: 개성일 2009. 04

제조원 **RP** 경기도 화성시 향남읍 상선리 908-8
알앤피코리아(주)
화성시 향남읍 상선리 908-8

뉴트리비타 설명서

[인쇄사항] 70모조 + 별색2도