

BAUSCH + LOMB

오큐바이트® 프리저비전정

【원료약품 및 분량】 1정 1099,345mg 중

토코페롤아세테이트2배산(KPC)	200mg(비타민D로서 100IU)
β-카로틴(10%(분규))	42,960mg(β-카로틴으로서 7,160IU)
아스코르브산 과립(90%(분규))	125,556mg(아스코르브산으로서 113mg)
산화제이구리(KPC)	0,501mg(구리로서 0,4mg)
산화아연(USP)	21,658mg(아연으로서 17,4mg)

첨가제(타르색소): 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) 알루미늄 레이크, 적색 40호(알루라레드 AC, Allura Red AC) 알루미늄 레이크

【성상】 진한 오렌지색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 눈의 건조감의 완화, 야맹증, 말초혈행장애 및 경련기시 증상의 완화 : 어께·목·결막·수족냉증(손발이 차가움)

【용법·용량】 성인 : 1일 1회 1정을 복용하거나, 의사의 지시에 따라 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 8세 미만의 영아 (갓난아기)
- 3) 황색씨병 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 : 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 일부, 수유부, 유아, 유아에 대한 투여
외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 증상으로 하는 기형발현(기형발생)증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이나 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용 전후에는 피할 것.
- 3) 항알로스테로제, 트리암테렌과 병용(함께투여)시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
- 4) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가 될 수 있다.
- 5) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기)등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 임상검사치에의 영향 : 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산노증환자(hyperoxaluria: 노증에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 일부수유부
- 4) 심장-순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자

7. 흡연자 : β-카로틴 투여와 흡연과 관련된 위험성에 대하여 상의 할 것

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 구역, 구토, 위부불쾌감, 설사, 변비, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부) 통증, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 동충성 관절부종(부기), 발진, 발적 (충혈되어 붉어짐), 혼수, 저혈압, 폐부종이 나타날 수 있다.

6. 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀접(뚜껑을 꼭 닫아) 하여 보관한다.
- 3) 의약품용 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품을 오용·잘못 사용(예)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

【포장단위】 120정

【사용기한】 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용한다

※ 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr/>)의 '의약품정보' 란을 참조하십시오.

※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청 (이치도록 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 【제품관리문의】 비수술 소비자상담실 080-080-3378

개정연월일: 2014.01.15

※ 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용)하지 마시고 구입처에서 교환(환)하기 바랍니다.

수입판매원
바우쉬+롬바우시사이테크(영업소)
서울시 강남구 테헤란로 98길 8
KT&G 코스닥타워 13층

제조의회사
BAUSCH + LOMB
Incorporated
Rochester, NY 14609
USA

제조사
Nutra
Manufacturing Inc.
1050 Woodruff Road
Greenville,
South Carolina 29607
USA

공동판매원
한대약품(주)
충남 천안시 동남구 봉세면 잔다리길 55