

쿨리브정

(수산화마그네슘 우르소데옥시콜산·노히엑스)
COOLIVE Tab.
300정

【제조회사】

.팜젠사이언스

경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【제조자】 대한뉴팜(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 66

※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
※ 자세한 복용하기 또는 신고사항은 의약품안전나라
(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인하시기
바랍니다.



설명서는 뒷면을 참고하세요

■ 원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500mg
- 우르소데옥시콜산(KP) 10mg
- 노히엑스(EP) 100mg
- 첨가제(타르색소) : 적색3호
- 기타 첨가제 : 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분, 글리콜산나트륨, 적색산화철, 카르나우바넵, 탭실드 흰색(93W064), 톨크, 폴리에틸렌글리콜6000, 프로필렌글리콜, 히프로멜로오스

■ 성상 : 분홍색의 장방형 필름코팅정

■ 효능·효과

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부 팽만, 장내이상발효, 치질

■ 용법·용량

- 1회 1정 성인(15세이상) : 1일 3회
- 11세~14세 : 1일 2회를 식전(식간 또는 식후)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용

하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 급성 복부질환(중수증, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색(창자마힘) 환자
 - 3) 만 7세 이하의 어린이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 신장장애 환자
 - 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

| 2-1

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우.
 - 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우.
 - 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 3) 장기간 계속 사용시 약물내에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

■ 포장단위 : 300정/병

■ 제조회사 : .팜젠사이언스 (경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50)

■ 제조자 : 대한뉴팜(주) (경기도 화성시 향남읍 제약공단1길66)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

※ 이 라벨의 개정일자 2023 년 01 월 18 일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharmgenscience.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

CLV/2023.01.18~00