

효과빠른 근육이완제

젤라펜^정

신경통 근육통 관절통 어깨통증 근육경련



※ 이 포장은 어린이 보호용 안전 포장입니다. 개봉시 무리한 힘을 가하지 않습니다.



[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 클로르록사존에 과민증 환자 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람 4) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 복용상 주의사항

1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴압박감과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 ② 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 ③ 천식이 나타난 경우 2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 광량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

4. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.

1) 심한 간, 신장에 환자 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자 5. 부작용

1) 과민증 : 두드러기, 발진, 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈, 오변색 등이

나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있다. 2) 간장 : 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다. 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다. 4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌다)한다고 판단되는 경우 투여한다.

7. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용투여시 상가작용이 나타남으로 신중히 투여한다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것. 3) 오용을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기, 상온(15~25°C)보관 (주·부작용)

[소비자상담실] 02)521-2308/www.miraepharmkorea.co.kr

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이 문안은(2012년 12월) 작성되었으며 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 약품정보는 미래제약 홈페이지 또는 (<http://ezdrug.klda.go.kr>)-(정보마당)-(의약품정보)에서 확인할 수 있습니다. 개정일 : 2012.12.12

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

아세트아미노펜(KP).....300mg

클로르록사존(KP).....250mg

[성상] 백색의 타원형 정제

[효능·효과] 신경통, 근육통, 관절통, 요통, 염좌통, 건통(아깨결림, 어깨통증), 근경련(근육경련), 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 체질환

[용법·용량] 성인 1회2정, 1일4회까지 공복시를 피하여 복용한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.