

콜바스타에프 정

일반의약품

[성분 · 함량] 1정중

아세트아미노펜(약전)	500.0mg
염산수도에페드린(U.S.P)	30.0mg
클로르페니라민말레산염(약전)	2.0mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(네덜란드산 소, 우유)	
첨가제(타르색소) : 황색 5호	

[성 상] 주황색의 장방형 필름코팅정제

[효능 · 효과] 호흡기성 알러지, 고초열(꽃가루 알레르기 비염), 부비동염과 관련된 증상의 일시적 완화[콧물, 재채기, 코 · 목(가려움), 눈(가려움, 눈물), 코막힘, 두통]

[용법 · 용량] 성인 및 12세 이상의 어린이 : 매 6~8시간마다 2정 복용,
최대 하루 8정을 초과할 수 없습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열제를 복용해야 하는 경우, 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이런 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 · 약사와 상의하십시오.
1) 12세 미만의 어린이 2) 임부 또는 수유부
3) 폐기종으로 인한 호흡곤란 또는 만성기관지염, 심장질환, 고혈압, 갑상선, 당뇨병, 녹내장 또는 전립선 비대로 인한 배뇨곤란이 있는 사람
4) 진정제 또는 신경안정제를 복용 중인 사람
5) MAOI를 투여 중이거나 투여를 중지한 지 2주 이내인 사람
3. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
1) 권장량을 초과하지 마십시오.
2) 이 약을 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.
4. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.
1) 부주의로 과량복용시, 즉시 의사 · 약사의 도움을 받으십시오.
2) 이 약을 7일 이상 복용하지 마십시오.
3) 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 3일 이상 지속되는 발열이 동반되거나 그밖의 다른 증상이 나타나는 경우 의사 · 약사와 상의하십시오.
4) 신경과민증, 현기증(어지러움) 또는 불면증이 생기면, 이 약의 사용을 중지하고 의사 · 약사와 상담하십시오.
5) 이 약은 어린이에게 흥분상태를 유발시킬 수 있습니다.
6) 이 약은 졸음을 일으킬 수 있으며 알코올, 진정제, 신경안정제의 병용(함께복용(사용))으로 졸음효과가 상승 될 수 있습니다.
7) 자동차나 기계조작 등 졸음이 오는 경우가 있으므로 주의하십시오.
5. 저장상의 주의사항
어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

[저 장 방 법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포 장 단 위] 자사포장단위

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. 110119