

제올라에스액

제올라에스액은 무더운 여름날 우리를 괴롭히는 모기, 벌레 등 각종 유해곤충들에 물려 붓고 가려울 때 그 증상을 자극없이 부드럽고 신속하게 가라앉혀주므로 민감하고 연약한 피부에도 부담없이 적용할 수 있는 친수성 액제입니다.

또한, 제올라에스액은 항히스타민, 진양, 진통, 소염(항염), 국소마취성분이 복합처방되어 땀을 많이 흘리는 여름철에 발생하기 쉬운 따따, 두드러기, 습진, 피부염 등으로 인한 가려움증, 통증, 발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기) 등의 각종 증상들도 신속히 개선시켜 주는 효과 빠른 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 100g 중

디펜히드라민(KP)	1,000mg
dl-카파(KP)	3,000mg
l-멘톨(KP)	3,500mg
디부카인염산염(KP)	500mg
에녹솔론(BP)	100mg
크로타미돈(USP)	5,000mg

【성 상】

특이한 냄새가 있는 무색~담황색의 투명한 액제

【효능 · 효과】

습진, 피부염, 따따, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물린데, 두드러기

【용법 · 용량】

1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
30개월 이하의 유아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
 - 습윤(습기 참)이나 미란(긁힘)이 심한 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 소아(경련을 유발할 수 있다)

3. 부작용(이상반응)

이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.
- 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 적용상의 주의

- 이 약은 외용으로부터 사용하고 내복하지 않는다.
- 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받는다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 40g

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 소비자상담전화 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2016. 10. 04