

연골성분 콘드로이틴 성분 90% 이상 함유

일반 의약품
분류번호: 03160

모아콘600

연질캡슐

모아콘600 연질캡슐은 인체의 결합조직성분인 콘드로이틴설페이트나트륨을 비롯하여 생체활성 비타민인 비타민B군과 신체의 정상적인 기능유지를 돕는 감마오리자놀, 이노시톨 등이 함유된 제제입니다. 이 약에 함유된 성분은 신경통, 근육통, 관절통을 완화시키며 관절을 보호하고 말초혈행장애 및 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움) 등에 효과적입니다. **모아콘600** 연질캡슐은 과다업무와 스트레스 등으로 결핍되기 쉬운 비타민군을 보급함으로써 눈의 피로, 육체피로, 구내염(입안염증) 등을 개선시켜주는 새로운 개념의 종합영양제입니다.

【원료약품 및 분량】 1캡슐(1,580mg)중

콘드로이틴설페이트나트륨(KPC)	300.0mg
티아민질산염(KP)	12.5mg
γ-오리자놀(KPC)	5.0mg
토코페롤아세테이트(비타민E로서 50.0IU)(KP)	50.0mg
니코틴산아미드(KP)	50.0mg
피리독신염산염(KP)	25.0mg
판토텐산칼슘(KP)	15.0mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6.0mg
이노시톨(KP)	20.0mg
시아노코발라민(KP)	30.0μg
첨가제(타르색소:황색5호, 청색1호, 적색40호)	

【성상】 황색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【용법·용량】 만 8세 이상 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, E의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 말초 혈행장애 및 갇힌기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨통증)), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기, 눈의 피로

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부, 수유부
 - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 이상반응
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐) - 구역, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 구토, 묽은변
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
 - 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 상호작용
 - 이 약을 투여할 경우 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 마십시오. : 레보도파
- 임상검사치에의 영향
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용), 남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 60, 120연질캡슐

【사용기간】 제조일로부터 24개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2012년 06월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kida.go.kr/kida2>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자 상담실: 02-568-0051 • 반독 및 교환처: 02-2244-1578

설명서 개정일 : 2012. 06

제조원

RP Corp

최대중재약 개발사

(주)알피 Corp

경도화성시 행림읍 생리 306-6