

변비개선제
스리엘 정

SRIEL Tabs.

【원료약품의 분량】

수산화마그네슘(KP)	500mg
우로스텍시콜산(KP)	10mg
노회건조엑스(EP)	100mg
(히드록시안트라센유도체(바바로인으로서) 18.0mg)	
·첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)	
·첨가제(타르색소): 황색5호	

【성 상】 주황색 타원형의 필름코팅정

【효능·효과】

변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

1회 1정 성인(15세 이상) 1일 3회, 11세~14세 1일 2회를 식전(식간 또는 식후)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 입부 또는 입신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 신(신장)장애 환자
- 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

이 약을 투여함으로써 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
- 3) 1주정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여

- 1) 이 약은 7세 미만의 영. 유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전하여(뚜껑을 꼭 막아)) 보관한다.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서를 꼭 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

설명서개정연월 : 2015년 04월

제품문의 : (032) 812-8356



제조발매원

영풍제약주식회사

인천광역시 남동구 학박로 333