

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호: 231(치과구강용약) 일반의약품

편리한 잇몸질환 치료제

잇치® 페이스트

EACH paste

※ 칫솔에 묻혀 3분간 양치 후 물로 헹구주세요. 치약을 따로 쓰실 필요가 없습니다.

치은염(잇몸염)이란 잇몸에 염증이 생겨 잇몸이 충혈되고 붓고 구취(입냄새) 등의 증상이 나타나는 것입니다. 일반적으로 치은염(잇몸염)은 치석의 축적과 치조(이빨) 밑막(뼈막)염, 외상(상치), 틀니, 세균감염 등에 의해 일어나게 되며 계속 진행될 경우 치주(치아주위조직)염으로 발전하게 됩니다. 잇치 페이스트는 카모밀레, 라타니아, 몰약 3가지 생약성분이 잇몸에 직접 작용하여 잇몸병의 여러증상인 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 출혈, 고름 등에 효과가 좋습니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

| | |
|----------------------------|--------|
| 주성분: 몰약틴크(별규) | 6.2mg |
| 주성분: 라타니아틴크(별규) | 12.5mg |
| 주성분: 카모밀레틴크(별규) | 12.5mg |
| 첨가제(보존제): 소르빈산칼륨(NF) | 1.0mg |

【성상】 이 약은 갈색과 흰색의 줄무늬가 있는 페이스트제로 특이한 냄새가 있고 맛은 자극성이 있습니다.

【효능·효과】 치은염(잇몸염)·치조(이빨)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·고름 등)의 완화

【용법·용량】 1회 1g(약 3cm)을 칫솔에 묻혀 1일 2회(아침, 저녁) 잇몸을 마사지합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 심한 구강(입안) 내 미란(혈음) 환자

2. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도감독 하에 사용하십시오.
- 3) 이 약은 치료용으로만 사용하고 안과용 및 기타에는 사용하지 마십시오.
- 4) 이 약을 투여함으로써 증상이 악화된 경우 또는 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과과)와 상의하십시오.
- 5) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과과)와 상의 하십시오.

3. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 잇치 페이스트 120g

【문의전화】 분사 : (02)2021-9300

소비자 상담실 : 080-023-1897(수신자 요금 부담)

【제조회사】 동화약품(주), 분사: 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장: 충청북도 충주시 충주산단1로 167

【제조사】 한국글머(주), 세종특별자치시 전의면 산단길 245

본 의약품은 KGMP품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서 작성일자 (2015년 10월 8일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인할 수 있습니다.