

일반의약품

조제용

마로엘정

Maroel^{Tab.}



500정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중 ■ 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500 mg, 노회 건조엑스(EP) 100 mg [히드록시안트라센 유도체(바바로인)(으)로서 20 mg], 우르소데옥시콜산(KP) 10 mg ■ 기타 첨가제 : 포비돈, 크로스카멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄 【효능·효과】·변비·변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질 【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1~2정, 1일 2회 아침, 저녁 공복시(식전 또는 식간식사때와 식사때 사이)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회(처음 복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다. 【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것. 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 장기간 계속 사용시 약물 에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용 해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관 할 것 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어

넣지 말 것 【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 【수신자부담고객 상담실】 080-988-8889 【제조외파자】 조아제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318 www.choa.co.kr 【제조사】 (주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청
한국의약품안전관리원 | 1644-6223, 14-3330

개정연월일 : 2025. 12. 01 (Rev.0)

제조번호 :
사용기한 :

착인공간
35×18 mm
인쇄 시 삭제

