



분류번호 319(기타의 비타민제)

[TOBICOM KID Chewable Tab.]

토비콤-S 연질캡슐 등의 우수한 눈영양제 개발에 앞장 서 왔던 안국약품(주) 부설중앙연구소에서는 캡슐제 복용이 어려운 어린이들을 위하여 쉽고 간편하게 복용할 수 있는 토비콤 키드 츠어블정을 발매하게 되었습니다. 토비콤 키드 츠어블정은 눈에 중요한 영양소로 로돕신의 주성분인 비타민A와 항산화제인 비타민C, 감마오리자놀 그리고 활성비타민(리보플라빈부티레이트, 인산피리독살, 히드록소코발라민아세트산염)이 이상적으로 배합되어 눈의 건조감, 야맹증, 눈의 피로 및 육체피로 등을 개선하는데 효과가 있으며, 특히 딸기향, 레몬향, 오렌지향이 첨가되어 맛있게 씹어 먹을 수 있는 제품입니다.

▶원료약품 및 분량 : 1정 중

팔미틴산레티놀 과립(KPC) (비타민A로서 500 IU)	1.0mg
질산치아민3배산(KPC) (질산치아민으로서 6.85mg)	21.0mg
리보플라빈부티레이트(KP)	2.0mg
인산피리독살(KPC)	10.0mg
히드록소코발라민아세트산염(KP)	2.6μg
아스코르브산(KP)	50.0mg
주석산수소폴리(DAB)	12.5mg
폴산(KP)	50.0μg
감마-오리자놀(KPC)	2.0mg
판토텐산칼슘(KP)	7.5mg
인산칼슘(BP)(칼슘으로서 1.88mg, 총 칼슘으로서 2.5mg)	5.0mg
식약청인정타르색소(황색203호, 황색5호, 적색3호)	

▶성상 : 적색(딸기향), 노란색(레몬향), 황색(오렌지향)의 네모, 하트, 클로바모양의 씹어먹는 정제

▶약리작용 및 특징점

1. 눈의 피로, 야맹증, 눈의 건조감의 완화

토비콤 키드 츠어블정은 로돕신의 주성분으로 간상체에서 암반응에 관여하며 모세혈관의 전반적인 대사를 촉진하는 팔미틴산레티놀과 근육의 피로회복을 위한 영양소로 시신경에 영양을 공급하여 시력을 회복하는 질산치아민, 안구의 형상을 유지하는 공막과 안모세혈관벽의 구성성분인 콜라겐의 합성으로 말초혈관을 개선하는 아스코르브산이 배합되어 탁월한 효과를 발휘합니다.

2. 활성비타민의 이상적 배합

토비콤 키드 츠어블정은 활성비타민(리보플라빈부티레이트, 인산피리독살, 히드록소코발라민아세트산염)이 이상적으로 배합되어 있습니다. 활성비타민은 장으로 흡수가 잘 되어 높은 혈중 농도를 나타내며, 신경과 근육 조직으로 이행이 잘 되어 장기간 지속적으로 작용합니다.

3. 소아 입맛에 맞고 복용하기 쉬운 츠어블정

딸기향, 레몬향, 오렌지향이 첨가되어 맛있게 씹어 먹을 수 있는 츠어블정입니다.

▶효능·효과 :

- 눈의 건조감의 완화
- 야맹증
- 눈의 피로
- 각기
- 다음 경우의 비타민A, B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로, 병중·병후의 체력저하시, 임신·수유기
- 다음 증상의 완화
 - 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)

▶용법·용량 :

3세부터 12세 미만 : 1일 2회, 1회 1정

12세이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2정을 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

▶사용상의 주의사항 :

1. 경고

- 1) 일부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인은 비타민A를 5,000IU/일 이상 복용하지 마십시오. (비타민A 결핍환자는 제외.)
- 2) 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스타탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자는 복용하지 않습니다.

[1일 허용량 제한] 아스타탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일) 이하로 조정(가능한한 최소량 사용) 하십시오. 60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음 환자는 복용하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(Hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아
- 4) 신결석 환자
- 5) 중증의 신부전 환자

3. 다음 환자는 신중히 복용하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 1세 미만의 유아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 복용을 피한다.
- 4) 과수산뇨증환자(Hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부·수유부
- 6) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장질환자
- 8) 저단백혈증 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약 복용에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 변비, 묽은변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진
- 2) 장기간 고용량을 복용할 경우 내성이 생길수 있습니다.
- 3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(Neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 일어날수 있습니다.
- 4) 엽산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10μg 이상 복용할 경우 혈액학적 반응이 나타날수 있다.
- 5) 대량복용으로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날수 있습니다.
- 6) 장기 복용에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이가 복용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시키십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로, 보조요법의 용량은 1일 5000IU 이상을 넘지 않도록 하십시오.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 복용할 경우에는 다음의 약물과 병용 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 임부·수유부, 미숙아, 유아의 복용

- 1) 외국에서 임신전 3개월로부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심을 하는 기형 발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인은 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 복용하지 마십시오. 또한 비타민A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터 섭취량을 주의하고 이 약에 의한 비타민A 복용은 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의가 필요합니다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

▶포장단위 : 자사포장단위

▶저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

▶사용기한 : 외부포장참조

※ 본품은 습기를 흡습하여 반점이 생길수 있으나 약효 및 인체에는 아무런 해가 없습니다.

사용 후 반드시 뚜껑을 꼭 닫아 주시기 바랍니다.

■ 본 제품은 재정경제부가 고시한 소비자피해보상규정에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 교환하여 드리오니 담당 사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다. 안국약품(주)
• 소비자 상담실 TEL. (02)3289-4253~9, 4275~7 • 수신자부담 TEL. 080-001-4125

※ 이 첨부문서 작성일자(2008년 6월 11일)이후 변경된 내용은 (홈페이지)나 (전화번호)에서 확인할 수 있습니다.

AG080611



건강의 동반자
안국약품(주)

• 본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75

• 공장: 경기도 화성시 향남읍 상신리 903-2