



화상, 상처, 햇볕에 탄데 태극 아즈렌-에스연고 (구아아줄렌)

일반의약품
분류번호: 264

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

- 유효성분 : 구아아줄렌(KP).....0.33mg
- 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....1mg
파라옥시벤조산프로필(KP).....1mg
- 기타 첨가제 : 백색바세린, 에탄올, 유동파라핀, 폴리소르베이트 60

【성상】 반투명한 파란색의 연고제

【효능·효과】

습진, 열상(화상), 그 외의 질환에 따른 미란(긁무름) 및 궤양

【용법·용량】

1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 도포한다(바른다).

【사용상의 주의사항】

1. 금 기
이 약의 성분에 대해서 과민증의 기왕력(병력)이 있는 환자.
2. 부작용(이상반응)
조사 총 예 784예 중 부작용(이상반응)은 4예(0.51%) 확인되었으나 어느 것이나
열감, 소양감(가려움), 따끔 따끔 감등의 피부의 자극증상이었다.
3. 적용상의 주의
안과용으로 사용하지 않는다.
4. 실온·차광 보존한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20g/튜브, 50g/튜브

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

- * 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를
통하여 교환하여 드립니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약
도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 08. 11