

일반의약품 | 1캡슐

만성/독성 간질환 보조치료에 ~

헤파비트 에프
연질캡슐



【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

• 유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(생규) 100 mg(실리마린(으)로서 57 mg), 티아민염산염(KP) 4 mg, 리보플라빈(KP) 4 mg, 피리독신염산염(KP) 4 mg, 니코틴산아미드(KP) 12 mg, 판토텐산칼슘(KP) 8 mg, 시아노코발라민1000 배산(KP) 1.2 mg(시아노코발라민(으)로서 1.2 µg) • 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호, 적색40호 • 첨가제(동물유래) : 젤라틴(소, 가축) • 기타 첨가제 : 콩기름, 팜유, 백납, 레시틴, 농글리세린, D-소르비톨액, 산화티탄, 에틸바닐린

【성 상】

황갈색의 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐제

【효능 · 효과】

다음 질환의 보조 치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

【용법 · 용량】

성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다. 치료 후 복용량을 1일 1~2캡슐로 줄인다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조번호 :

사용기한 :



(01)08806562052219

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않다. 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 설사 2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것. 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시킬 것. 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【제 조 자】

(주)바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354 (소비자상담 : 031-692-2900)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다. ※ 작성일자[2021. 07. 14.(Rev.0)] 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)