

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※제품에 대한 기타 자세한 사항은 이지드렉(<http://ezdrug.kida.go.kr>)-(정보마당) ->(의약품동정보)에서 확인할 수 있습니다. 개정일 : 2009.12.31

제 조 원 : **미래제약주식회사**
MIRAE PHARM KOREA CO., LTD
경기도 안성시 신소천로 137번지

경부공인
KGMP
신약개발을 지원함

일 반 의 약 품
분류번호 : 114

10정

효과빠른 코감기약

데이감-S 정

- 콧물, 재채기
- 코막힘
- 알레르기성 비염
- 급성비염

원료약품 및 그 분량 : 1정(725mg) 중
아세트아미노펜(약전) 500mg
클로르페니라민말레인염(약전) 2mg
수도에피드립염산염(우에스피) 30mg
동물유래성분 : 유당수화물(기원동물소, 사용부약유)

성 상 : 백색의 장방형 필름코팅정제
효능·효과 : 호흡기성 알레르기, 고초열(꽃가루 알레르기 비염코염), 부비동염과 관련된 증상의 일시적 완화(콧물, 재채기, 코·목(가려움, 눈(가려움, 눈물), 코막힘, 두통)
용법·용량 : 성인 및 12세 이상 어린이 : 6시간 마다 2정씩, 일 최대 8정을 초과하지 말 것

[사용상의 주의사항]

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(발진, 발열, 발적충혈되어 붉어짐, 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람. 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것
1) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염코염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람. 2) 지금까지 이 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람. 3) 수도 또는 인공물자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기)·유아 및 14세 이하의 어린이. 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자(노인) 6) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등이 있는 부인, 수유부 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람.

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
1) 용법·용량을 잘 지켜 것. 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 말 것 : 진해거담

제(가침·가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것. 4) 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고, 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아(갓난아기)에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다. 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. ①이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축(손발이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 ②고열을 수반하여 발진, 발적충혈되어 붉어짐, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 ③천식이 나타난 경우 6) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대시시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것
1) 복용하는 동안 발진, 발적충혈되어 붉어짐, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배도곤란, 헛기증(어지러움) 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 2) 복용하는 동안 졸음 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것. 3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 4) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 자사포장단위
[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관
[소비자 상담실] 02521-2308, www.miraepharmkorea.co.kr