

코감기, 알레르기성 비염치료제 디펜콜 캡슐

일반의약품
분류번호: 141

코감기 · 코막힘 · 콧물 · 재채기

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

주성분 : 벨라돈나총알카로이드 (히요스시아민으로서 0.1235mg, 별규)0.13mg
 주성분 : 클로르페니라민말레산염 (KP)4.00mg
 주성분 : 리소짐염산염 (KP)30.00mg
 주성분 : 페닐레프린염산염 (KP)3.33mg
 동물유래성분(기원동물 및 사용부위) : 리소짐염산염(닭의 난백)
 착색제(타르색소) : 적색3호, 청색1호

[성상] 흰색의 분말이 든 상부는 담청색, 하부는 흰색의 경질 캡슐제

[효능·효과] 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 :
 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리무거움

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후 복용하십시오. 복용간격은 4시간 이상으로 하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 7세 미만의 소아
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 지금까지 약에 의한 알레르기 증상(발진, 발적, 관절통, 천식, 가려움)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 고혈압 환자
- 3) 심장에 환자
- 4) 녹내장(눈이 아프고 흐릿함)환자, 배뇨곤란 환자
- 5) 당뇨병, 갑상선기능 항진증 환자
- 6) 지병이 있는 환자, 허약체질인 사람 또는 고열 환자
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 8) 고령자
- 9) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 부작용

1) 정신신경계
 출혈성뇌졸중, 어지러움, 불면, 심한 두통, 신경과민을 일으킬 수 있습니다.

2) 순환기계
 심계항진을 일으킬 수 있습니다.

3) 소화기계
 구역, 구토, 구갈, 변비, 식욕부진이 나타날 수 있습니다.

4) 피부
 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정 되는 경우 및 고열을 동반하는 발진, 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받도록 하십시오.

5) 기타
 발진, 발적, 배뇨장애가 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 투여에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 않도록 주의하십시오.
- 2) 이 약은 극약 성분이 함유되어 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 3) 수일간 복용해도 증상이 나아지지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여하십시오.
- 5) 장기간 계속하여 투여하지 마십시오.

5. 상호작용

다른 비염용내복약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담약, 진통제, 알레르기용약 등)과 병용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10caps.

첨부문서 최초 작성년월일 2005. 02. 01
 첨부문서 최종 개정년월일 2014. 12. 05

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품질불량 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인약도서관(http://drug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

DS-1412-01

제조 및 판매원
동성제약주식회사
 본사 : 서울시 도봉구 도봉로 683(방학동)
 공장 : 충남 아산시 둔포면 관대안길 45
소비자 상담전화 : 080-001-0921
 www.dongsung-pharm.co.kr