

일반의약품 정보

【유효성분】	1정 중
토코페롤비세테이트2배산(KP)	60.0mg (비타민E로서 30IU)
아스코르빈산97(별규)	618.6mg (아스코르브산으로서 600mg)
셀레늄함유건조효모(KP)	46.3mg (셀레늄으로서 25μg)
γ-오리자놀(KP)	5.0mg
비오틴(USP)	0.045mg
황산이연(USP)	61.75mg (아연으로서 22.5mg)
시아노코발라민1000배산(KP)	5.0mg (시아노코발라민으로서 5μg)
폴산(KP)	0.25mg
티아민질산염(KP)	15.0mg
리보플라빈(KP)	10.0mg
피리독신염산염(KP)	5.0mg

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시)
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 · 각기
 - 눈의피로 · 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 · 잇몸 출혈·비출혈(코피)예방

■ 이연의 보급

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 1일 1회 2정 복용 또는 1일 2회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. / 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. / 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우에는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. / 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 3) 인부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 9) 이 약은 황색 5호(섀넬로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. / 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리기 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애에 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 9) 우발적으로 과량복용 한 경우 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 / 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사에서 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전 후에는 피할 것.

일반의약품 정보【사용상의 주의사항】(계속됨)

6. 저장상의 주의사항 / 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】

용기 하단 표시일까지

【첨가제】

첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 2호, 황색 5호
기타 첨가제 : 경질무수규산, 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이벨(간색(03B45052), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨

【성상】 적색 장방형의 필름코팅정

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

제 조 · 판 매
부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조번호 : 19001

사용기한 : 2022. 06. 10

