

소화불량, 과식

다우제 큐 정

【성상원료약품 및 그 분량】 1정(570mg)중

비오디아스타제2000 I(식약청고시) 5mg

【전분당화력(pH5.0) 75단위, 단백질소화력(pH3.0) 47.5단위, 단백질소화력(pH8.0) 85단위】
리파제 II(식약청고시) 5mg

【지방소화력(pH6.0) 30단위】

우르소데옥시콜산(약전) 10mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물, 첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색1호

【성 상】 녹색의 장방형 필름코팅 정제

【효능·효과】 식욕부진(식욕감퇴), 소화불량, 소화불량에 의한 위부(상복부)·복부(배부분)팽만감, 과식, 위체(체함), 가슴이 답답함

【용법·용량】 성인(15세 이상)은 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. : 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사에게 상담할 것. : 의사의 치료를 받고 있는 사람.
3. 복용에 있어 다음 사항에 주의할 것. : 이 약의 정해진 용법·용량을 엄수한다.
4. 복용 중 또는 복용 후에 다음 사항에 주의할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 변변(똥은변), 하리(설사)를 발생하는 경우가 있다.
 - 2) 2주간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우는 일시 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상의한다.
5. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피해 가능한 한 습기가 적고 시원한 장소에 보관한다.
 - 3) 용기내의 충전물은 수송 중의 정제 파손 방지용이므로 개봉 후에는 버린다.
 - 4) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 타 용기에 넣지 않는다.
 - 5) 사용기한을 넘은 경우에는 사용하지 않는다.
6. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. : 이 약은 황색 4호 (타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】 031)672-3431, www.miraepharmkorea.co.kr

개정일 : 2009.10.07

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여드립니다

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→〈정보마당〉→〈의약품등정보〉에서 확인할 수 있습니다.