

일반의약품 | 조제용

뉴마르딘 정
[방풍통성산건조엑스(4.6→1)]

일반의약품 | 조제용
분류번호: 219

뉴마르딘 정

[방풍통성산건조엑스(4.6→1)]

New Mardin Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 방풍통성산건조엑스(4.6→1) (별규) 237.5mg
- 첨가제 (타르색소) : 황색203호(알루미늄레이크)
- 첨가제 (동물유래) : 유당수화물 (소의 원유에서 유래)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드실리콘디옥사이드, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】

노란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

배에 피하지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 증상 :
고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 홍조), 비만, 부기, 변비

【용법·용량】

보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁 수축작용 또는 골반내 장기의 총혈작용에 의해 유·조산의 위험이 있다.)
- 2) 수유부 (이 약에 함유되어 있는 대황 중 안트라퀴논은 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 설사약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에 환자
- 3) 부종 환자
- 4) 고령자 (일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (다른 약물을 투여받고 있는 환자)
- 6) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있다.)
- 7) 위장이 허약한 환자 (식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자 (증상이 악화될 수 있다.)
- 9) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자 (이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 10) 땀이 많이 나는 환자 (땀 과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
- 11) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 12) 배뇨장애 환자 (질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 13) 갑상선기능항진증 환자 (질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 14) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 15) 당뇨병 환자 [마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.]

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등 (1일 최대 배합량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중 증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰 (혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상

이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

- (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
 - (4) 피부 : 발진·발적, 가려움 등이 나타나는 경우
 - (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른 맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
 - (6) 비뇨기계 : 배뇨장애
 - (7) 간기능 장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능 장애 (전신의 나른함, 황달 (피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월 (변비에 복용하는 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것.
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 병용 투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용 투여시 특히 주의할 것.
- 5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제 (티록신, 리오치오닌), 카테콜아민제제 (에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제 (테오필린, 디프로필린)과 병용시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신 무력감, 정신 흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 복용할 것.
- 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제 (푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제 (트리클로르메타이마이드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 (사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 500정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【제 조 자】 코스맥스파마 (주) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

【제조외의자】 (주) 뉴젠팜 전북 익산시 석암로9길 117

* 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

* 첨부문서를 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개정년월일 : 2019년 03월 20일

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부 [Tel:02-580-5900(대)]로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com) 의 각 제품란에 기재되었으며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 차세대 의약품 통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

생명공학 제약기업
(주) 뉴젠팜
전라북도 익산시 석암로 9길 117

우수약품제조관리기준
KGMP 적격지정업체

P-3-2-291 0019