

마시는 간기능 개선제- 레보골드액

「일반의약품」
분류번호 391

■ 원료약품의 분량

- 산제부 : 1회 용량 중 L-오르니틴염산염(KP)	60mg
L-시트룰린(별규)	60mg
- 액제부 : 1 바이알 (15mL) 중 L-아르기닌염산염(KP)	120mg
첨가제(보존제) : 소르빈산칼륨(NF)	40mg

■ **성상** : 상부용기내의 흰색의 산제와 갈색병의 무색 내지 미황색(연노랑)의 투명한 시럽제가 든 복합제

■ **효능 · 효과** : 다음 질환의 보조 치료 : 급 · 만성 간질환, 경증(가벼운 증상)의 간부전(간기능 이상)증, 간경변

■ **용법 · 용량** : 1일 2~3회, 1회 1병씩 복용하십시오.

※ 상부 캡을 열고 산제부의 용기마개를 세게 누르고 흔들어서 섞어 용해(녹여)서후 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 구상성분에 대해 과민증 환자
- 2) 심한 신기능 장애 환자
- 3) 간성혼수 환자
- 4) 아미노산 대사장애 환자 (특히 선천성 효소 결핍 환자)

2. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것.
- 2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

3. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ **포장단위** : {[[산제부] 상부캡 230mg, [액제부] 15mL/병]}X30

{[산제부] 상부캡 230mg, [액제부] 15mL/병]}X60

{[산제부] 상부캡 230mg, [액제부] 15mL/병]}X1

■ **첨부문서 최종 개정일** : 2016년 12월 15일

■ 복용방법



〈주의〉

산제를 흔들어 섞은 후 속마개를 열었을때 그림⑤번과 같이 동그란 마개가 병속에 빠지지 않고 속마개에 달려 있는지 확인하고 드십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용 기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.

※ 기타 문의사항은 의 · 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사

경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10