

웰러드연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 홍화유(USP).....	333.33mg
토코페롤아세데이트(KP).....	6.67mg
피리독신염산염(KP).....	0.67mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	0.05mg
파라옥시벤조산프로필(KP).....	0.005mg

첨가제 [착색제(타르색소)] : 황색5호, 적색3호, 황색203호

첨가제 [연질캡슐기제(동물유래성분)] : 젤라틴(기원: 소, 피부)

기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 콩기름, 팜유, 폴리에틸렌글리콜400

【성상】 유백색의 유상물질(기름상태 물질)이 든 주황색 타원형 연질캡슐제

【효능·효과】 비만증, 당뇨병·본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선

【용법·용량】 1일 3회, 1회 3캡슐을 식전 30분 전에 복용한다

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 구성 성분에 과민증 환자
 - 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
 - 3) 파킨슨병 치료제인 '레보도파' 성분의 의약품들이 이 약을 함께 복용하는 경우에는 피리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 탈탄산화를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약(감소하여 복용(사용))될 수 있으므로 이 약과 함께 사용 시 신중히 투여한다.
 - 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용
 - 1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)이 나타날 수 있다.
 - 3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나, 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자에 이 약에 함유된 비타민E를 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 5) 이 약에 함유된 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경구용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기와 교체하지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 500캡슐/병

【제조사】 영풍제약(주) (인천광역시 남동구 함박외로 333)

♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다

♣ 이 설명서의 개정일자 2017년 08월 21일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다

♣ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
WEL 2017.08.21-00

제조의뢰자
우리들제약(주)
www.wooridulpharm.com

본사·공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211