



비만증, 고콜레스테롤혈증

발렌시아 연질캡슐

일반의약품
분류번호: 218

‘살찐 사람이 건강하게 보인다’는 고정관념에 갇힌 사람이 많은 것 같은데 이는 잘못된 생각이다. 신장에 따라 균형 잡힌 체중을 갖는 것이 건강의 기본이다. 특히 젊은데도 불구하고 살찐 사람은 주의해야 한다고 말하는 것도 고혈압, 심장병, 당뇨병 등의 이른바 성인병에 걸릴 확률이 평균 체중의 사람에 비해 2배 이상 높다는 연구 결과가 증명하고 있기 때문이다. 컴퓨터 등 급속한 전자 제품의 보급에 따른 운동 부족에 의해 비만증은 해마다 증가하는 경향이 있다. 리놀레산(Linoleic Acid)은 황화유(Safflower Oil)에 다량 함유하고 있는 Vitamin-F라고 하는 불포화 지방산으로 지질대사의 이상에 의한 체내 조직이나 혈관 벽에 침착된 과 지방을 연소시키고 혈액중의 과잉 Cholesterol을 배설시켜 그 양을 정상치로 조정한다.

‘발렌시아연질캡슐’은 과지방을 연소시키는 리놀레산(Linoleic Acid)을 주성분으로 하고, 리놀레산(Linoleic Acid)의 작용을 더욱 강화 시켜주는 Vitamin-E(토코페롤아세테이트)와 B6(피리독신염산염)를 배합한 새로운 형태의 약제이다.

【특 징】

1. 지질 대사의 이상을 개선하여 과 지방을 Energy화하는 Linoleic Acid와 Vitamin-E, B6만을 배합한 Capsule제로 비만예방 역할을 한다. 비만증의 치료제로 신체에 무리를 주지 않는 우수한 제제이다.
2. ‘발렌시아연질캡슐’은 탈 Cholesterol 작용이 현저하므로 비만뿐만 아니라 동맥경화 및 당뇨병의 염려가 있는 사람의 지방대사를 개선한다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

황화유(USP)	333.33mg
토코페롤아세테이트(KP)	6.67mg
피리독신염산염(KP)	0.67mg
첨가제(타르색소) : 황색 5호	
첨가제(동물유래) : 젤라틴 (기원동물 : 소, 사용부위 : 피부)	

【성 상】 유백색의 유상(기름상태)액이 든 주황색의 타원형 연질캡슐 (BLCA)

【효능·효과】

다음 질환의 지질대사 이상의 개선 :
비만증, 당뇨병성고콜레스테롤 혈증, 본태성고콜레스테롤 혈증

【용법·용량】

1일 3회, 1회 3캡슐, 식전30분 전에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 구성 성분에 과민증 환자
 - 2) 대두유(콩기름)에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
- 3) 파킨슨병 치료제인 ‘레보도파’ 성분의 의약품을 이 약과 함께 복용하는 경우에는 피리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 탈탄산화를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약(감소하여 복용)될 수 있으므로 이 약과 함께 사용시 신중히 투여한다.
- 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 해당(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용(이상반응)

- 1) 소화기계 : 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 2) 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)이 나타날 수 있다.
- 3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 에스트로젠을 포함한 경구(먹는)용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자에 이 약에 함유된 비타민E를 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 5) 이 약에 함유된 피리독신을 1일에 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기와 교체하지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관. 【포장단위】 150, 300캡슐

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국약물안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2015. 02. 02



충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 71



경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담 전화 080-300-8282
http://www.taiguk.co.kr