

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래 내용을 확인하세요.

【유효성분】	1정 중
시메티딘(KP)	50.0mg
규산알루미늄산마그네슘(NF)	100.0mg
(산화알루미늄으로 30.7mg, 산화마그네슘으로 24.1mg)	
히드로탈시트(BP)	125.0mg
(산화알루미늄으로 21.3mg, 산화마그네슘으로 50.0mg)	
탄산수소나트륨(KP)	100.0mg

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 체합, 구역

【용법·용량】 성인(15세 이상 ~ 80세 미만) : 1회 2정씩 복용한다. 필요시 4시간 간격으로 1회 2정씩 1일 3회까지 복용할 수 있다. 단, 1일 3회(6정)를 초과하여 복용하지 말 것.

【사용상 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 다음 질환으로 치료를 받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식, 류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다) 3) 다음 약물을 복용하고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아즐게 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다) 4) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자 (혈구수의 감소가 증가될 수 있다) 5) 히스타민 H₂-수용체 길항제에 과민반응의 병력이 있는 사람 6) 소아(15세 미만) 및 고령자(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다), 80세 이상의 고령자에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있다. 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 시메티딘은 모유 중 이행되므로 수유부가 복용할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 위장약작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 이상반응이 나타날 수 있다
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것. 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 졸음, 어지럼, 혼란감이 생길 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 말 것. 2) 이 약을 복용할 시에는 알콜음료를 섭취하지 말 것(혈중 알콜농도를 높일 수 있다).

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약물을 복용중인 사람 : 약물 상호작용에 의해 이상반응의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있다. (1) 이 약에 함유된 시메티딘은 다음 약물들과 상호작용으로 이들의 배설을 지연시켜 약효가 강하게 나타날 수 있다. : 기관지확장제(테오필린 등), 혈액응고저지제(와로파린 등), 항전간제(페니토인 등), 벤조디아제핀계 약제(디아제팜, 트리azol람 등), 삼환계항우울제(이미프라민 등), 협심증·고혈압 치료제(베타-차단제 프로프라놀롤 등), 칼슘길항제(니페디핀 등), 부정맥치료제(엑실레틴 등), 마크로라이드계 항생물질(테트라사이클린 등), 뉴-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등) (2) 이 약에 함유된 테산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다. : 테트라사이클린계 항생물질 및 뉴-퀴놀론계 항균제 (3) 약물에 의한 과민반응의 병력이 있는 사람 3) 고령자(65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 복용한다. 4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 이상반응을 은폐시킬 수 있다. 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다. 6) 복통이 지속되는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다. 7) 신장병의 병력이 있는 환자 8) 이 약은 황색 4 회(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 복용 직후에 두드러기, 부종, 가슴답답함과 동시에 안색蒼백, 수족냉증, 식은땀, 숨가쁨 등 이 나타나는 경우 2) 고열을 동반한 발진, 발적, 열상의 수종 등의 심한 증상이 전신의 피부, 입, 눈의 점막에 나타나는 경우 3) 알레르기 증생(발진, 발적, 가려움, 부종)이 나타나는 경우 4) 변비, 설사, 두통, 발열, 권태감, 탈각감, 감기 증상, 하지·점막하출혈, 사지저림 및 굳은감, 두근거림, 황달, 전신부종, 혈뇨가 나타나는 경우 5) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 : 다른 질환이 있을 수 있다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 장기적으로 계속 복용 하지 말 것. 2) 2주간을 초과하여 계속 복용하지 말 것. 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 4) 과량 복용시에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의할 것.

7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【포장단위】 20정(10정/포x2)

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【판매자】 경보제약  종근당홀딩스 가족회사

【제조사】  미래제약 경기도 안성시 공단2로 104

일반의약품정보 (계속됨)

【성상】 연두색의 원형 필름코팅정

【사용기한】 용기 측면에 표기

【첨가제】

- 첨가제(타르색소) : 청색1호 알루미늄레이크, 황색4호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭실드녹색(99G625), 히드록시프로필셀룰로오스

 미래제약