

안 아픈 상처치료제

프라믹신 연고

화상
피부감염
외상

프라믹신연고는 USP에 수재되어 널리 사용되고 있는 3종의 항생물질과 국소마취작용을 가진 Pramoxine HCl이 첨가되어 있는 새로운 피부감염증 치료제입니다.

프라믹신연고는 Bacitracin Zinc, Polymyxin B sulfate와 광범위 항생제인 Neomycin sulfate가 복합되어 포도상구균(포도알균), 연쇄상구균, 녹농(푸른고름)균 등에 최대 강도의 3중 항생효과를 나타낼 뿐 아니라 감염을 방지하며 화상·절상(베인 상처)·찰과상(긁힌상처) 등의 상처치유를 촉진시켜 줍니다. 프라믹신연고는 종래의 항생제 연고와 달리 새롭게 Pramoxine HCl이 첨가되어 상처부위의 통증을 경감시키는 복합 항생제 연고입니다.

- **우수한 피부감염 치료효과** - 프라믹신연고는 각종 형태의 농피증(고름피부증)을 일으키는 포도상구균(포도알균), 연쇄상구균 같은 그람양성균 및 그람음성균에 감수성이 있는 3가지 항생제가 복합처방되어 농가진(고름딱지증), 농창, 습진, 포진(물집), 지루성피부염과 기타 외상·화상의 염증 및 화농(끓음)증에 우수한 치료효과를 나타냅니다.
- **진통효과** - 프라믹신연고는 Pramoxine HCl의 강력한 국소마취작용에 의해 피부자극으로 인한 통증을 경감시킵니다.
- **자극감 해소** - 프라믹신연고는 통증을 완화시켜 상처부위를 진정시키고 마찰을 감소시켜 주며 따끔따끔한 피부 자극감을 없애줍니다.
- **안전성** - 환부(질환 부위)에 도포(바름)시 Penicillin같은 피부과민반응을 유발하지 않으며 또한 국소자극 작용이 없어 도포(바름)시 쓰러거나 아프지 않습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

네오마이신황산염(KP)	3.5mg(역가)
바시트라신아연(KP)	500IU(역가)
폴리믹신B황산염(KP)	10,000IU(역가)
프라믹신염산염(USP)	10mg
첨가제(보존제):파라옥시벤조산메틸(KP)	0.8mg
첨가제(보존제):파라옥시벤조산프로필(KP)	0.2mg

【성상】 흰색 또는 옅은 황색의 연고제

【효능·효과】 베인·창상·화상에 의한 감염증 예방 및 통증완화

【용법·용량】 2세이상 : 1일 1~3회 질환부위에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 아미노글루코사이드계 항생제 및 바시트라신에 의한 과민반응이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 고막 천공(궤양)이 있는 환자

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 과민반응: 발진 등의 과민증상이 나타나는 경우
- 2) 장기연용(계속복용): 신장에(신장장애), 난청(귀먹음)이 나타나는 경우(장기연용을 피할 것).
- 3) 갑작증후(가려움증, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집) 등)가 나타나는 경우(갑작(과민상태로 만들)되어 있을 수 있으므로 관찰을 충분히 할 것).

- 4) 내균성 또는 비감수성균이 발육과다를 초래할 수 있다. 이러한 현상이나 자극, 과민반응, 중복감염이 나타나는 경우
- 5) 2주 이상 사용하여도 증상 개선이 보이지 않을 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 외용으로만 사용할 것.
- 2) 광범위한 화상, 궤양이 있는 피부에는 장기간 사용하지 말 것.
- 3) 안과용으로는 사용하지 말 것.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보존할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)) 보존할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 5g, 10g, 15g, 20g, 450g

* 사용(유효)기한이 월까지만 기재되어 있는 경우에는 해당월의 마지막 일까지 사용가능합니다.

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 01. 11

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821