

지질대사 개선

총화유 333.33mg
토코페롤아세테이트 6.67mg
피리독신염산염 0.67mg

일반의약품
분류번호 : 218

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

총화유(USP) 333.33mg
토코페롤아세테이트(KP) 6.67mg
(비타민E로서 6.67아이.유)
피리독신염산염(KP) 0.67mg
첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
첨가제(타르색소): 청색1호, 황색5호, 황색203호

[성 상] 미황색의 내용물이 든 일면 연녹색 일면 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 비만증, 당뇨병, 본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선

[용법·용량] 1일 3회, 1회 3캡슐을 식전 30분 전에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 구성 성분에 과민증 환자
- 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자
- 3) 파킨슨병 치료제인 "레보도파"성분의 의약품용 이 약을 함께 복용하는 경우에는 피리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 발탄산화를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약될 수 있으므로 이 약과 함께 사용시 신중히 투여합니다.
- 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 피부 : 발진, 발적이 나타날 수 있습니다.
- 3) 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나, 양이 점점 많아질 수 있습니다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 4) 에스트로겐을 포함한 경우용 파임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 이 약에 함유된 비타민E를 투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 5) 이 약에 함유된 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 뒀을 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기와 교제하지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 300캡슐

*본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
*의약품용을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
*사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
*작성일자 이후 변경된 내용은 온라인 의약품도서관(drug.mfds.go.kr)의약품정보 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2016.05.02. (Rev. 0)

[제 조 자] (주)알피코프 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

[제조자의 및 판매자] (주)CMG제약 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27