

이지덴 캡슐

일반의약품

분류번호 : 231 치과구강용약

【원료약품 및 그분량】 1캡슐 중

리소짐염산염(KP)	30.0mg(역가)
아스코르브산(KP)	150.0mg
토크페롤아세테이트2배산(KP)(토크페롤아세테이트로서 5I.U.)	10.0mg
카르바조크롬(KP)	2.0mg
부형제 : 옥수수전분	
동물유래성분(주성분) : 리소짐염산염(닭, 난백)	
동물유래성분(첨가제) : 유당수화물(소, 우유)	
경질캡슐첨가제(타르색소) : 적색 3호, 청색 1호, 황색 5호	

【성 상】 연분홍색의 가루가 든 상 · 하부 암청색의 경질캡슐

【효능 · 효과】 치주치료 후 치은염, 경 · 중등도 치주염의 보조치료

【용법 · 용량】 성인 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 15세 미만의 소아
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상 (예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 4) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약 복용 후 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타난 경우
- 2) 피부 : 피부점막만중후군(스티븐스-존슨 중후군), 독성표피괴사용해(리얼중후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안출혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진 · 발적, 화상모양의 수증 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 장기간 계속하여 사용하지 말 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 120캡슐, 120캡슐 X 2케이스

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품을 복용할 때에 캡슐제가 기도에 걸릴 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
- ※ 본 캡슐제의 포장용기(PTP)를 개봉할 때 손에 상처가 생길수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상에 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품 안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 소비자상담실 : ☎080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)
- ※ 작성년월일 : 2016.10.21