

두드러기·가려움·습진·옫

알레스탐[®]-에스 정

피부알러지, 양·한방 복합치료제

알레스탐-에스정은 여러 원인에 의하여 발생하는 피부알러지 및 피부질환 치료제입니다. 두드러기는 가장 흔한 피부질환으로 그 원인을 확실히 규명하기는 어려우나 주로 알러지를 일으키는 알러젠(꽃가루, 먼지, 애완동물의 털 등), 또는 항체에 대한 과민반응 등에 의하여 발생하여 심한가려움증, 붉은반전, 부어오름을 특징으로 하여 심한 경우에는 구토, 복통(배아픔) 및 호흡곤란 까지도 일으킬 수 있습니다. 이러한 증상은 체내 히스타민의 활성이 증가됨으로써 나타나므로 알레스탐-에스정의 항히스타민작용으로 증상을 효과적으로 치료합니다. 습진은 여러 원인에 의하여 피부가 쉽게 혈어 염증 및 가려움증을 수반하는 피부질환으로서 알레스탐-에스정의 항히스타민 및 항염증 작용으로 효과적인 치료를 합니다. 옫은 대표적인 알러지 반응 중의 하나로 이 또한 알레스탐-에스정으로 쉽게 예방 및 치료가 됩니다.

【성분·함량】(1정 중)

인진호탕건조엑스(10→1)(별규)	26.66mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	6mg
첨가제(타르색소): 청색1호, 황색4호	

【성 상】 연녹색의 장방형 당의정

【약리작용 및 특징】

1. 양·한방 복합작용 (인진호탕건조엑스)

알레스탐-에스정에 함유된 인진호탕 건조엑스는 한의약에서 두드러기에 필수적으로 사용되는 인진호, 처자 및 대황 3종류의 생약성분이 함유되어 있어 청열(열을 내려줌), 이습(습을 없애줌), 퇴황(황달을 제거) 등의 능력이 있으며 간 해독을 통해 두드러기, 습진의 원인이 되는 독소를 근본적으로 제거합니다.

2. 항히스타민작용 (클로르페니라민말레산염)

알레스탐-에스정은 항히스타민제 중에서 효과가 우수하고 부작용이 적어 널리 사용되고 있는 클로르페니라민말레산염을 함유하고 있어 체내 히스타민의 활성 증가로 나타나는 각종 알러지, 피부질환 및 가려움증을 신속하게 제거합니다.

3. 혈관수축 및 교감신경유사작용 (dl-메틸에페드린염산염)

알레스탐-에스정에 함유된 dl-메틸에페드린염산염은 혈관수축 및 교감신경유사작용을 가지고 있어서 가려움증에 유효합니다.

4. 이상적 배합

알레스탐-에스정은 여러 유효성분을 이상적으로 배합하여 두드러기, 습진, 옫 등 각종 원인에 의하여 발생하는 피부알러지 및 피부질환을 효과적으로 치료합니다.

【효능·효과】 두드러기, 습진, 옫, 가려움증

【용법·용량】

- 성인(15세이상) : 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용하십시오.
- 8~14세 : 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 8세 미만의 소아
- 2) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인 (이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁 수축작용 혹은 골반내 장기의 유출작용에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있습니다.)
- 3) 수유부 (이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약물 복용을 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 마십시오.)
- 4) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 지금까지 알레르기용약, 감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 멀미약 등에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증을 일으킨 적이 있는 환자
- 2) 녹내장(예:눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨(소변을 누)곤란 환자
- 3) 다른 약물을 투여중인 환자
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 5) 설사, 연변(똥은 변)의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 6) 현저하게 위장이 허약한 환자
- 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 8) 허약체질 환자, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자 (부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있습니다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등이 나타난 경우

4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 대항의 사해(설사)작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의하십시오.
- 2) 자극성 완화제는 장기간 계속 사용시 약물내에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용하지 마십시오. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사 하여야 합니다.
- 3) 다른 한방제제 등을 병용(함께 복용)하는 경우는 함유 생약의 중복에 주의하십시오. 대항 함유제제는 병용투여(함께 복용)시 특히 주의하십시오.

5. 부작용

- 1) 이 약에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구갈(목마름), 구역, 구토, 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2) 이 약은 하제(설사약)성분을 함유하고 있으므로 투여에 의해 묽은 변이 나타날 경우도 있으나 만약 심한 복통(배아픔)을 수반하는 설사가 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의 하십시오.

6. 일반적 주의

- 1) 이 약은 극약 성분이 함유되어 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 이 약의 투여에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않도록 주의하십시오.
- 3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
- 4) 장기간 계속하여 투여하지 마십시오.

7. 상호작용

다른 설사약, 알레르기용약, 항히스타민제를 함유하는 약(예: 멀미약, 감기약, 진해(기침을 그치게 함) 거담제(가래약))과는 병용투여(함께 복용)하지 마십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 3년

[포장단위] 자사포장단위(외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질,변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**
충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2012.07.20