

고함량 기능성 비타민 임팩타민 파워에이플러스

임팩타민 파워에이플러스는 두뇌집중, 과로, 술, 각종 약물 등으로 소모되는 **비타민 B군 10종**을 고단위 보충하여 피로회복, 체력보강에 효과적이며 **눈, 뼈 건강 성분**을 함유하여 **청소년기 성장**에 도움을 주는 비타민입니다.

특 장 점

1. 고함량비타민B군 10종이 고단위로 함유되어, 신속한 피로회복 및 체력보강에 효과적
2. 칼슘, 마그네슘, 비타민D가 함유되어 청소년기 뼈 건강에 도움을 주고, 베타카로틴이 함유되어 눈 건강에도 효과적
3. 활성형 벤토이아민(B1) 함유로 생체내 이용률 8배 우수

주 효능·효과



피로
일이 부족 많아져
자도 자도 피로하신 분



눈의피로
컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분



어깨통증
목, 어깨가 뭉치고
걸리시는 분



구내염
바쁜 스케줄에 입 주위가 험고
입병이 자주 재발하시는 분

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

벤토타이민 (비타민B1)(KP) 50.0mg (티아민염산염으로서 36.15mg)	아노시톨 (비타민B)(KP) 75.0mg	경질산하마그네슘(USP) 41.50mg (마그네슘으로서 25mg)
리보플라빈 (비타민B2)(KP) 50.0mg	비오틴 (비타민B)(USP) 0.25mg	무수인산수소칼슘(USP) 170.00mg (칼슘으로서 50mg)
니코틴산아미드 (비타민B3)(KP) 50.0mg	폴산 (비타민B9)(KP) 0.20mg	산화아연(KP) 18.70mg (아연으로서 15mg)
판토텐산칼슘 (비타민B5)(KP) 50.0mg	베타카로틴20%과립(별규) 10.50mg (베타카로틴으로서 2.10mg)	
피리독신염산염 (비타민B6)(KP) 50.0mg	농축콜레칼시페롤분말(EP) 2.00mg	
시아노코발라민1000배산 (비타민B12)(KP) 50.0mg	(비타민 D3로서 200IU)	
클린타르타르산염 (비타민B)(DAB) 75.0mg		

효능·효과

1. 다음 경우의 비타민 A, D, B1, B2, B6 의 보급
 - 1) 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다증증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 · 각기, 눈의 피로
 - 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) · 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
3. 아연의 보급

용법·용량 12세 이상 어린이 및 성인 : **1일 1회 1~2정** 식후 복용하십시오.

※ 비타민B군의 함량이 높아 빈 속에 복용 시 일시적으로 속쓰림, 미식거림 등이 있을 수 있으니 식사 후 바로 복용하세요.

성 상 미황색 내지 황색의 타원형 필름코팅정



사용상의 주의사항

1. 경고
 - (1) 일부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종 질환), 신장질환 환자
 - (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장결석 환자
 - (5) 심한 증상의 신부전 환자
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
 - (1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - (4) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생)증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료를 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - (5) 심장 순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 감시배대체를 투여 중인 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종, 설사, 변비, 묽은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 상복부 통증, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 폐부종
 - (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - (6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - (7) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양증) 위험을 높일 수 있다.
 - (8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - (9) 우발적으로 과량복용 한 경우 (10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
 - (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
 - (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다. (5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

※ 복용 후 두통을 꼭 단아주세요! (비타민은 온도/습도/열 등에 약하므로 서늘하고 건조한 곳에 보관해주세요)

사용기간 제초일로부터 24개월

포장단위

자사포장단위

※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지나거나 변질 · 변색 · 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

제조사 : (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14



대웅 (주)대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일: 2015.07.10

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.