

목감기 및 각종 염증에 비오마신

(은교산건조엑스(8.16 → 1))

일반의약품

분류번호:114

캡슐

비오마신캡슐은 중국의 의서 온병조변(溫病條辨)에 수록되어 있는 은교산이란 약방을 기본으로 개발한 한방 생약제제로 발열에 의한 각종 염증성 질환(인후염(목구멍염), 기관지염 등) 및 감기의 여러증상(입이 마르고, 두통, 기침 등)에 탁월한 해열, 진경(경련완화), 진통작용을 합니다. 특히 순수 생약성분으로 처방 되어있어 양약 성분으로된 항생 · 소염제(항염증제)보다 부작용이 적어 안심하고 복용하실 수 있습니다.

【성분·함량】 (1캡슐 중)

은교산건조엑스(8.16 → 1) (별규)	490 mg
금은화(KP)	710 mg
연 교(KP)	710 mg
박 하(KP)	426 mg
길 경(KP)	426 mg
감 초(KP)	426 mg
담죽연(생규)	284 mg
형 개(KP)	284 mg
두 새(생규)	356 mg
우방자(생규)	356 mg
영양각(생규)	22 mg

첨가제(타르색소) : 적색 3호, 적색 40호, 황색 203호, 청색 1호

【약리작용】

- **금은화** : 열을 내리고 독을 푸는 작용으로 각종 균의 억제작용, 면역부활, 항바이러스, 진경작용 (경련완화작용)
- **연 교** : 열을 내리고 독을 풀며, 고름을 빼어내는 작용으로 감심, 이노, 항균, 항바이러스작용
- **우방자** : 풍열을 없애고, 독을 풀며, 발진을 순조롭게 하는 작용으로 항염, 이노 완화, 항균작용
- **길 경** : 담(가래)을 삭히고, 기침을 멈추며, 폐기를 잘 통하게 하는 작용으로 진정, 진통, 해열, 항염, 항궤양작용
- **담죽연** : 열을 내리고 가슴이 답답한 것을 낮게 하며 담을 삭히고 경련을 멈추게 하는 작용
- **형 개** : 해열, 진경(경련완화), 소화 작용을 합니다.

【성 상】 갈색의 분말이 충전된 상부-암자색, 하부-자색의 캡슐체

【효능·효과】 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

【용법·용량】

보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
5세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) · 유아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
 - 1) 고혈압 환자
 - 2) 심장병 또는 신장병(신장(콩팥)장애) 환자
 - 3) 부종(부기) 환자
 - 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
 - 5) 위장이 허약한 환자

- 6) 지금까지 약에 의해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사 와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
 - (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - (3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등
- 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우**

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시키십시오.
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께복용)시 위알도스테론 증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
- 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**
 충청북도 충주시 양성면 복상길 28

