

無항생제 여드름 치료제

파티마겔 2.5%

가수과산화벤조일

일반의약품
분류번호 : 265

【원료약품 및 그 분량】 1g 중
가수과산화벤조일(USP)..... 35mg
(과산화벤조일로서 25mg)

【성상】 유백색의 겔제

【효능·효과】 심상성 여드름(보통여드름)

【용법·용량】

치료반응과 환자의 내약성(약에 대한 내성)에 따라 용량을 조절한다. 환부(질환 부위)를 깨끗이 씻어내고 이 약을 보통 1일 1~2회 가볍게 두드리면서 바른다. 치료를 시작할 때에는 1일 1회(취침전)바르고, 환자의 적응 여부를 검사하여 적응이 잘되면 1일 2회 (아침, 저녁)로 증가시킨다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 염증환자
 - 이 약 및 이 약 성분에 과민성 또는 그 병력이 있는 환자
- 다음 부위에는 신중히 투여할 것.
 - 간성 및 지성 아토피 피부(이 경우 낮은 농도와 적합한 기제를 사용한 제제를 선택한다.)
 - 미란(긁힘)성 피부
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용(이상반응)
 - 접촉피부염, 알레르기성 접촉피부염 및 상처를 남기는 심한 홍반(붉은 반점)이 나타날 수 있다.
 - 이 약은 모발과 유색 섬유를 표백시킬 수 있다.
 - 중증(심한 증상) 또는 지속적인 자극 증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 태양광선에 대한 감수성이 증가할 수 있다.
 - 안면(얼굴)의 일시적 부종(부기), 피부염, 피부발진이 나타날 수 있다.
 - 처음 사용 후 가벼운 작열감(화끈감)과 치료한지 며칠 후 발적(충혈되어 붉어짐) 또는 박리(벗겨짐)가 나타날 수 있다.
 - 갑작스런 피부의 건조 및 박리(벗겨짐)현상이 1~2주 후에 나타날 수 있으나 이러한 피부박리(벗겨짐)작용은 정상적 치료 과정이며 치료를 일시적으로 중지하면 1~2일 내에 감소된다.
- 일반적주의
 - 자극 증상을 최소화하기 위해서 다음에 유의한다.
 - 예비치료에서 이미 자극이 나타난 피부에는 적용하지 않는다.
 - 다른 치료적인 국소 각질용해제 또는 세제와 병용(함께 사용)하지 않는다.
 - 순한 세안제를 사용하고 (1일 세안횟수 : 최대 2회) 향수 또는 알코올을 함유하는 화장품은 사용하지 않는다.
 - 치료초기 및 치료 중에는 태양광선에 노출되는 것을 피하고 태양광선 차단용 제제를 사용하는 것이 바람직하다.
 - UV 램프를 사용하지 않는다.
 - 피부색이 밝은 사람 또는 피부가 약한 부위에는 특히 주의한다.
 - 특히 치료초기에는 약한 자극증상이 나타날 수 있다. 이것이 경미한(가벼운) 정도에 머무를 경우 피부 불내성 또는 알레르기를 의미하지 않는다.
치료하기 전에 '시험도포(좁은 피부 부위에 연속적으로 10~15일간 반복해서 바르는 것)'를 통해 환자의 민감성을 검사해 봄으로써 확인할 수 있다.
 - 자극증상이 나타나면 투여간격을 연장하거나 보다 낮은 농도를 사용하고 자극이 과도하면 사용을 중지

하고 다른 적절한 치료를 한다.

- 상호작용
다른 국소 여드름약(비타민A 유도체 함유 여드름약 포함)과 병용(함께 사용)하지 않는다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 이 약의 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료 상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 주의하여 투여하며, 특히 임신 마지막 달에는 적용하지 않는다.
 - 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려져 있지 않으나, 치료 상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 주의하여 적용한다.
- 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
- 과량투여시의 처치
 - 심한 인설(비늘), 홍반(붉은 반점), 부종(부기)이 나타나면 사용을 중지한다.
 - 부작용(이상반응)을 신속히 해결하기 위해서는 냉찜질을 시행할 수 있다. 반응이 알레르기발현(드러냄)성이 아닌 과량투여와 관련있는 것으로 판단되면 증상과 징후가 사라진 후 용량을 줄여서 조심스럽게 다시 시도할 수 있다.
- 적용상의 주의
 - 이 약은 외용으로만 적용한다.
 - 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어낸다. 자극이 지속되는 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 상처나 예비적인 피부병변(병에 의한 몸의 변화)에 적용하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30g

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
※ 부작용(이상반응) 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2014. 07. 11

제조사
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 고객상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>