



소부쿨 캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

소브레롤(KP) 60mg

L-카르보시스테인(KP) 375mg

첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호

첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원 : 소, 사용부위 : 가죽)

[성상]

흰색의 내용물이 든 상·하부 녹색의 경질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 질환에서의 점액 및 점액농분비물의 용해 배출

- 1) 기관지염, 기관지확장증, 기관지폐렴 특히 천식, 폐기종 등의 호흡기부전이 수반될 때
- 2) 폐결핵이나 진폐증이 수반되는 기관지 카타르
- 3) 비인두염, 후두기관염

2. 수술시 호흡기 합병증의 예방과 치료

[용법·용량]

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다.

[사용상 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 위·십이지장궤양 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 간장애 환자
- 2) 심장애 환자
- 3) 위·십이지장궤양의 병력이 있는 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 때때로 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 복부(배부분)팽만감, 설사, 구갈(목마름), 위통, 드물게 위장관출혈, 가슴쓰림 등이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 발진, 홍반(붉은 반점) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 콧물, 전신압박감이 나타날 수 있다.

4. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

5. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여한다.

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간]

제조일로부터 36개월

[포장단위]

자사포장단위

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(☎080-001-0795) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

작성일자 : 2015년 03월 04일

제조 및 판매자 :



BioTechnology Origination

주비티오제약

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 70
www.btpharm.com