

디젠정

분류번호: 232

일반의약품

DIZEN Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

탄산마그네슘(KP).....	80mg
탄산수소나트륨(KP).....	250mg
Dizet-100(KPC).....	3.75mg
(α -아밀라아제 375단위, β -아밀라아제 45단위, 프로테아제 375단위)	
스코폴리아엑스(KP).....	7.5mg
· 첨가제(타르색소) : 황색 4호	

【내용량】

- 디젠 10정 : 601mg × 10정(총 중량 6.01g)
- 디젠 500정 : 601mg × 500정(총 중량 300.5g)

【성상】 황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

위산과다(위염, 위·십이지장궤양에 관련된 것도 포함),
속쓰림, 배가 거북함, 위부팽만감, 체함(위체), 구역, 구토,
위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(입맛없음), 소화촉진
<다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.>

【용법·용량】

성인 1회 2정, 1일 3회 식사 때와 식사 때 사이에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약물 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 사람
 - 3) 이 약을 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로
이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 가려움등)이
나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와
상의한다.
 - 2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이
나타날 수 있다.

- 3) 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이
나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 때에는
복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
4. 상호작용
위장진통·경련완화약과 함께 복용하지 말 것.
5. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 이하의 영·유아에게 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한
곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어
넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 10, 500정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- * 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에
따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시
사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된
제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여
드립니다.
- * 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2010년 12월
03일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부
(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭
(ezdrug1da.gokr)의약품 정보를 참조하십시오.
첨부문서 개정일 : 2010년 12월 03일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16
공장: 강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>