

이모나 캡슐

EMONA®

잇몸질환은 심각한 상태로 진행되기 이전에는 본인이 이상을 느끼지 못하므로 방치하기 쉽습니다.

치은염(잇몸염)은 잇몸에 염증이 생긴 상태로 양치질 할 때나 사과를 먹을 때 피가 나오며 점점 진행되면 잇몸이 붓고 색깔이 푸르게 변색되며 심해지며 출혈과 부종(부기), 발적(충혈되어 붉어짐), 통증등이 나타나게 됩니다. 따라서 빠른 시기에 적절한 약물로 치료해주는 것이 좋습니다. 이모나캡슐은 잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 출혈, 통증을 수반하는 치은염(잇몸염) 및 치조(이빨)농루를 효과적으로 완화시켜주는 역할을 합니다.

원료약품 및 그 분량 : 1캡슐(400mg) 중

염화리소짐(식약청고시)	30mg
아스코르브산(약전)	150mg
토코페콜아세테이트50%(식약청고시)	10mg
(토코페콜아세테이트로서 5mg)	
카르바조크롬(식약청고시)	2mg

동물유래성분 : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

성 상 : 옅은 주황색 가루가 들어있는 상하부 진한녹색의 경질캡슐제

효능·효과 : 치은염(잇몸염)·치조(이빨)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·통증)의 완화

용법·용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말것. 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자 2) 난백 알레르기 환자 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자 2) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자 3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들어 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)의 병력이 있는 사람 4) 아토피피부염, 기관지천식, 약물 알레르기, 식물 알레르기 등의 알레르기성 소인이 있는 환자 5) 양친, 형제 등이 알레르기 증상의 병력이 있는 환자

3. 부작용 1) 속(소크) : 드물게 속(소크)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면(얼굴)창백, 사지냉각(팔다리 찬느낌), 혈압저하, 청색증, 의식불명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절히 처치한다. 2) 과민증 : 때때로 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 3) 소화기계 : 설사, 때때로 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 드물게 구내염(입안염) 등이 나타날 수 있다. 4) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다. 5) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부접막인증후군), 리얼 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안출혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상상의 수증 등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한 증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다

5. 저장상의 주의사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

포장단위 : 자사포장단위

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (주의·부작용)

사용기간 : 제조일로부터 24개월

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ☎ 소비자상담실 : 031)672-3431

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)—(정보마당)—(의약품정보)에서 확인할 수 있습니다. 개정일 : 2009.12.31