

일반의약품

분류번호: 265 기생성 피부질환용제

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

• 토크클리어젤 5%	
가수과산화벤조일(USP)	70 mg(과산화벤조일로서 50mg)
• 토크클리어젤 2.5%	
가수과산화벤조일(USP)	35 mg(과산화벤조일로서 25mg)

[성 상] 유백색의 겔제

[효능·효과] 심상성 여드름(보통 여드름)

[용법·용량] 치료 반응과 환자의 내약성(약에 대한 내성)에 따라 용량을 조절한다. 환부(질환 부위)를 깨끗이 씻어내고 이 약을 보통 1일 1~2회 가볍게 두드리면서 바른다. 치료를 시작할 때에는 1일 1회(취침 전) 바르고, 환자의 적응 여부를 검사하여 적응이 잘 되면 1일 2회(아침, 저녁)로 증가시킨다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 염증 환자
 - 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 다음 부위에는 신중히 투여할 것.
 - 건성 및 지성 아토피 피부(이 경우 낮은 농도와 적절한 기제를 사용한 제제를 선택한다.)
 - 미란(지무름)성 피부
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다
- 부작용
 - 접촉피부염, 알레르기성 접촉피부염 및 상처를 남기는 심한 홍반(붉은 반점)이 나타날 수 있다.
 - 이 약은 모발과 유색 섬유를 표백시킬 수 있다.
 - 중증(심한 증상) 또는 지속적인 자극 증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 태양광선에 대한 감수성이 증가할 수 있다.
 - 안면(얼굴)의 일시적 부종(부기), 피부염, 피부 발진이 나타날 수 있다.
 - 처음 사용 후 가벼운 작열감(화끈감)과 치료한지 며칠 후 발적(충혈되어 붉어짐) 또는 바리(벗겨짐)가 나타날 수 있다.
 - 갑작스런 피부의 건조 및 바리(벗겨짐) 현상이 1~2주 후에 나타날 수 있으나 이러한 피부 바리(벗겨짐)작용은 정상적 치료 과정이며 치료를 일시적으로 중지하면 1~2일 내에 감소된다.
- 일반적 주의
 - 자극 증상을 최소화하기 위해서 다음에 유의한다.
 - 예비 치료에서 이미 자극이 나타난 피부에는 적용하지 않는다.
 - 다른 치료적인 국소 각질 용해제 또는 세제와 병용(함께 사용)하지 않는다.
 - 순한 세안제를 사용하고(1일 세안 횟수 - 최대 2회) 향수 또는 알코올을 함유하는 화장품은 사용하지 않는다.
 - 치료 초기 및 치료 중에는 태양광선에 노출되는 것을 피하고 태양광선 차단용 제제를 사용하는 것이 바람직하다.
 - UV 램프를 사용하지 않는다.

- ⑥ 피부색이 밝은 사람 또는 피부가 약한 부위에는 특히 주의한다.
- 특히 치료 초기에는 약한 자극 증상이 나타날 수 있다. 이것이 경미한(가벼운, 대수롭지 않은) 정도에 머무를 경우 피부 불내성 또는 알레르기 반응을 의미하지 않는다. 치료하기 전에 '시험 도포(좁은 피부 부위에 연속적으로 10~15일간 반복해서 바르는 것)'를 통해 환자의 민감성을 검사해봄으로써 확인할 수 있다.
- 자극 증상이 나타나면 투여 간격을 연장하거나 보다 낮은 농도를 사용하고 자극이 과도하면 사용을 중지하고 다른 적절한 치료를 한다.
- 상호작용
 - 다른 국소 여드름약(비타민A 유도체 함유 여드름약 포함)과 병용(함께 사용)하지 않는다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 이 약의 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고(웃돈다고) 판단되는 경우에만 주의하여 투여하며, 특히 임신 마지막 달에는 적용하지 않는다.
 - 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려져 있지 않으나, 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고(웃돈다고) 판단되는 경우에만 주의하여 적용한다.
- 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
- 과량투여 시의 처리
 - 심한 인설(비늘, 껍질), 홍반(붉은 반점), 부종(부기)이 나타나면 사용을 중지한다.
 - 부작용을 신속히 해결하기 위해서는 냉찜질을 시행할 수 있다. 반응이 알레르기 발현(드러냄)성이 아닌 과량투여와 관련 있는 것으로 판단되면 증상과 징후가 사라진 후 용량을 줄여서 조심스럽게 다시 시도할 수 있다.
- 적용상의 주의
 - 이 약은 외용으로만 적용한다.
 - 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어낸다. 자극이 지속되는 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 상처나 예비적인 피부 병변(병에 의한 물의 변화)에 적용하지 않는다.
- 저장상의 주의사항 : 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

[포장단위] 30g

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.
- ※ 본 제품은 영아(갓난아기) · 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가 정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스 (080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

[소비자상담실] ♣080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)

제조자: 태극제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 3길 123

제조외지자: 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

작성일자 : 2015. 07. 07

