


고단위 은행엽 혈액순환개선제

행 맥 정
은행엽엑스 120mg



행맥정은 강한 생명력을 지닌 은행나무의 푸른 잎으로 만든 천연 생약제제입니다. 콜레스테롤, 혈전, 노폐물에 의해 혈액이 탁해지거나 혈관이 좁아지거나 혈관의 탄력이 떨어지게 되면 혈액순환 장애가 일어나 만성 두통, 어지러움, 손발시림, 손발저림 등이 나타나고, 동맥경화, 뇌졸중, 고혈압, 심장질환 등 각종 성인병을 유발할 수 있습니다. 현대인에게는 스트레스, 공해의 증가, 생활의 변화 등으로 그 위험성이 날로 증가되고 있습니다.

행맥정은 뇌혈액순환을 촉진시켜 만성 두통, 어지러움, 귀울림 등의 만성뇌혈관질환을 치료하며, 말초 혈액순환을 개선함으로써 손발저림, 손발시림, 간헐성 파행증 등의 혈액순환장애 증상을 치료해주는 뇌 및 말초혈액순환장애 치료제입니다.

【원료약품 및 그분량】 1정 중

은행엽엑스(KPC) 120, 0mg

(총 키크로플라본배당체로서 28, 8mg)

첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색1호

【성 상】 녹색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
3. 이명, 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌 기능 장애

【용법·용량】

1. 성인

- ① 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여하십시오.
- ② 기질성 뇌기능 장애 : 은행엽엑스로서 1회 40mg~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg(1정), 1일 2회 경구투여하십시오.
2. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약에 과민한 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

드물게 가려운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 마십시오.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 없습니다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

※ 이 첨부서 작성일자 (2009년 07월 10일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-561-4011)에서 확인할 수 있습니다.

※ 구입시 유효기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
소비자 상담실 (02) 561-4011

• 제조자 : (주)한국비엘아이-경기도 화성시 향남읍 상신리 향남제약공단 907-1

• 제조의뢰자 : 한국슈바이제(주)-경기도 안산시 단원구 독내동 448-2

• 판매자 : (주)대웅생명과학-서울 강동구 성내동 469-6