

일반 의약품

분류번호: 231

K G M P

적격업체

인두염 · 편도염 · 구내염

세가톤 트로키

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

염화세칠피리디늄(U.S.P) 1.5mg

[성 상] 황색의 원형 트로키제

[용법 · 용량]

성인 : 염화세칠피리디늄으로서 1회 1.5mg 1일 4~5회 씹거나 삼키지 말고 입안에서 천천히 녹여 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[효능 · 효과] 1. 주효능 효과

다음질환에 의한 염증의 완화 : 인두염, 편도염, 구내염.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

알레르기성 접촉성 습진이 나타나기 쉬운 환자

2. 부작용

1) 과민증 : 발진 등이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 정신신경계 : 고열, 두통이 나타날 수 있다.

3) 소화기계 : 구역이 나타날 수 있다.

4) 구강 : 발진, 두드러기, 미란, 드물게 구강. 인두의 작열감 등 구강점막의 과민반응이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

3. 소아에 대한 투여

정제를 삼킬 위험이 있으므로 3세 이하의 영, 유아에는 투여하지 않는다.

4. 적응상의 주의

1) 침으로 천천히 녹여 복용하며 유효성분이 장시간 입안에 머물도록 씹거나 삼키지 말고 가능한 오래 입안에 물고 있다.

2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알레르기 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[포장단위] 자사 포장단위

[저장방법] 기밀용기 실온보관

●본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

●제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054)552-5381)로 문의하시기 바랍니다.



알파제약

경상북도 문경시 산양면 진정리 622