



※ 이 문서는 본제를 사용하시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관 하십시오.

일반의약품

분류번호: 114

두통, 감기로 인한 인후통, 입이 마르고 기침

파이네신 캡슐(은교산)

파이네신캡슐은 중국의 의사 溫病條辨에 수제되어 있는 은교산이란 처방을 기본으로 개발한 한방 생약제제로 발열에 의한 각종 염증성 질환(인후염, 기관지염 등) 및 감기의 제증상(입이 마르고, 두통, 기침 등)에 탁월한 해열, 진경, 진통작용을 한다. 파이네신캡슐의 성분 중 하나인 금은화는 항균, 면역부활, 소염, 항바이러스 등에 약리작용이 밝혀져 있어 악성 종기, 인후염에 효능이 있습니다. 또한 연교는 열을 내리고 해독하며 부기를 가라앉히는 소염작용과 항염, 항균작용이 뛰어나 중양과 단독, 연추창에 사용된다고 합니다. 이러한 성분들이 이상적으로 배합되어 제조된 파이네신캡슐은 각종 염증에 우수한 효과가 있으며 감기, 후두염, 기관지염, 폐렴 등에도 사용할 수 있습니다. 특히 순수 생약성분으로 처방되어 있어 약 성분으로 된 항생 소염제보다 부작용이 덜하므로 안심하고 복용하실 수 있습니다.

【주요 성분의 약리작용】

- 금은화 : 열을 내리고 독을 푸는 작용으로 각종 균의 억제작용, 면역부활, 항바이러스, 진경작용
- 연 교 : 열을 내리고, 독을 풀며, 고름을 빼어내는 작용으로 감시, 이노, 항균, 항바이러스 작용
- 우방자 : 풍열을 없애고, 독을 풀며, 발진을 순조롭게 하는 작용으로 항염, 이노, 완화, 항균작용
- 길 경 : 담을 삭히고, 기침을 멈추며, 폐기를 잘 통하게 하는 작용으로 진정, 진통, 해열, 항염, 항균작용
- 담죽엽 : 열을 내리고 가슴이 답답한 것을 없애며 담을 삭히고 경련을 멈추게 하는 작용
- 형 개 : 해열, 진경, 소화 작용을 한다.

【원료약품의 분량】 <1캡슐(510mg)중>

은교산건조엑스(별규)	490mg	담죽엽(생규)	284mg
금은화(약전)	710mg	형 개(약전)	284mg
연 교(약전)	710mg	두 시(생규)	356mg
박 하(약전)	426mg	우방자(생규)	356mg
길 경(약전)	426mg	영양각(생규)	22mg
담 초(약전)	426mg		

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상 녹색불투명 · 하 미황색불투명의 캡슐체

【효능·효과】 두통, 감기로 인한 인후통, 입이 마르고 기침

【용법·용량】 성인 1일 3회, 1회 2캡슐씩 식전 또는 식후에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상담할 것. 1) 물이 허약한 환자. 2) 위가 약한 환자. 3) 혈압이 높은 환자 또는 고령자. 4) 심장이나 신장에 장애가 있는 환자. 5) 부종이 있는 환자. 6) 지금까지 약을 복용하면서 두드러기가 나타나, 피부가 붉어지거나, 가려움증 등을 일으킨 일이 있는 환자. 7) 임신부나 임신 가능성이 있는 환자.
2. 현재 의사의 치료를 받고 있는 환자.
3. 복용할 때 다음 사항에 주의할 것.
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 소아에게 복용시킬 때에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것. 3) 본 제품은 5세미만의 젖먹이 어린이에게는 복용시키지 말 것.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상담할 것.
 - 1) 본제의 복용에 의해 요량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것. 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것. 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로 근병증이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것. 4) 본 제품을 복용함으로써 두드러기가 나타나, 피부가 붉어지거나, 가려움증, 오심, 식욕부진, 위부불쾌감 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.
5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것. 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치 이드제에 이노제(트리클로로메타자이드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것. 2) 수일간 복용하여도 증상이 호전되지 않을 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것. 3) 정기간 계속해서 사용할 경우에는 의사나 약사와 상담할 것.
5. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. (의약품안전과-11924호, 2004.06.25)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관. 【포장단위】 자사포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 약국, 병 · 의원 등의 개설자를 통하여 교환하여 드립니다.

2007.5작성



주식회사 정우제약

충남 아산시 신창면 읍내리 80-13

http://www.pharm.co.kr