

엘-시스틴 여질캡슐 500mg

천연필수아미노산제제

우리의 간장은 생명에너지의 공급과 각종 효소의 생산으로 물질대사에 관여할뿐 아니라 혈액을 정화하여 되돌려 보내주며, 각종 약물이나 알콜등 유해물질을 해독하고 각종 질병에 대하여 방어와 공격력을 갖는 쉬지 않고 활동하는 중요한 장기입니다.

엘-시스틴은 인체의 손·발톱이나 머리카락, 그리고 녹음중에 고농도(약20%)로 함유되어 있는 천연 필수아미노산으로서 인체내에서는 다음과 같은 중요한 작용을 합니다.

1. 항염증(抗炎症), 항알러지 작용(습진, 피부염 방지)
2. 손·발톱등 각질(角質)의 성형촉진 작용
3. 피부의 대사촉진, 특히 기미 주근깨등 색소의 대사작용

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐중

엘-시스틴(유.에스.피)	500밀리그램
레시틴(엔.에프)	20밀리그램
Soybean oil(약전)	569밀리그램
황색 5호, 황색 203호, 적색 3호(타르색소고시)	적량

【성상】 미황색의 내용물이 든 주황색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

1. 습진, 두드러기, 피부발진, 여드름
2. 손톱, 발톱이나 머리카락이 쉽게 갈라지는 등의 각질부위 질환의 치료

【용법·용량】

L-시스틴으로서 1일 1000~2000mg(2~4캡슐)을 1개월 중 10~20일간 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 중증 신기능 장애 및 간성훈수 환자
 - 2) 6세 이하의 어린이
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 이 약 및 이 약 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 시스틴 뇨증 환자
 - 3) 신결석증 환자
3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 때때로 구역, 드물게 설사, 구갈, 가벼운 복통 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 3) 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것.
 - 4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 실온(1~30℃), 차광보관, 기밀용기 사용기간 : 2년

【포장단위】 자사포장단위

【제조사】 (주)서흥캡셀 경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317

제조의뢰자:



한국웨일즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 석곡동 642-4

소비자상담실 : 031-494-5995

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일(WA000518) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할 수 있습니다.