

스타록신캡슐

(은교산건조엑스)

스타록신캡슐은 청열소염약(淸熱消炎藥) 금은화, 연교를 중심으로하고, 여기에 발산작용을 하는 해표약(解表藥)과 이뇨구수약(利尿駒水藥), 거담약(祛痰藥)등을 이상적으로 배합한 처방으로, 각종 두통과 입이 마르는 증세, 목이 아픈 감기(인후통), 기침등에 잘 듣는 순수한방 청열소염제(淸熱消炎濟)입니다. 각종 종기나 인후염, 악창(惡瘡)을 다스리는 금은화는 소종배농(消腫排膿)작용과 청열해독작용이 강한 연교와 연합하여 상승된 청열소염작용을 나타냅니다. 그 외 약재들의 작용은 다음과 같습니다.

- 형 개 : 성질이 따뜻하며 무독한 해표약으로 인종창상(咽腫癰傷)과 초기 발진을 다스립니다.
- 박 하 : 성질이 따뜻하며 무독한 패표약으로 풍열을 흩어버리며 특히 인후통이나 옹종(癰腫)을 다스립니다.
- 우방자 : 이뇨구수약으로 담음(痰飲)을 몰아내고 천식기침과 종창(腫脹)을 치료해 줍니다.
- 길 경 : 치해거담약(治咳祛痰藥)으로 담을 삭히고 기침을 멎게하며 폐기(肺氣)를 원활하게 해줍니다.
- 담죽엽 : 가는 대나무잎으로 성질이 차며 소담청열(消痰淸熱)하고 중풍의 실음불어(失音不語)와 장열두통(壯熱頭痛)등을 다스립니다.
- 두 시 : 성질이 냉하고 발한(發汗)작용이 있으며 상한(傷寒)에 의한 두통을 다스립니다.
- 영양각 : 성질이 차며, 눈을 밝게하고 간을 맑게하며 독(毒)을 풀고 경계(驚悸)를 진정시킵니다.
- 감 초 : 여러가지 약의 독성을 풀고 약재들이 서로 조화하여 약효가 상승되도록 합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐중

은교산건조엑스(8.16→1)(별규).....	490밀리그램
금은화(약전)	710밀리그램
연 교(약전)	710밀리그램
박 하(약전)	426밀리그램
길 경(약전)	426밀리그램
감 초(약전)	426밀리그램
담죽엽(생규)	284밀리그램
형 개(약전)	284밀리그램
두 시(생규)	356밀리그램
우방자(생규)	356밀리그램
영양각(생규)	22밀리그램

【성 상】

갈색의 분말이 든 상부 적색, 하부 담황색의 경질캡슐제

【효능·효과】

두통, 감기로 인한 인후통, 입이 마르고 기침

【용법·용량】

성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐씩 식전 또는 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 1)몸이 허약한 환자
 - 2)위가 약한 환자

- 3)혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 4)심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 5)부종이 있는 환자
- 6)지금까지 약을 복용하면서 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나, 가려움증 등을 일으킨 일이 있는 환자
- 7)임산부나 임신 가능성이 있는 환자
- 8)의사의 치료를 받고 있는 환자
2. 복용할 때 다음 사항에 주의할 것.
 - 1)정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2)소아에게 복용시킬 때에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
 - 3)본 제품은 5세 미만의 젓먹이 어린아이에게는 복용시키지 말 것.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1)본제를 복용함으로써 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나, 가려움증, 오심, 식욕부진, 위부불쾌감 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.
 - 2)본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
 - 3)위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 4)근병증: 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
 - 5)수일간 복용하여도 증상이 호전되지 않을 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담할 것.
 - 6)장기간 계속해서 사용할 경우에는 의사나 약사와 상담할 것.
4. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
5. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1)어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 2)직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3)오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) · 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위



한국웨일즈제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡동 642-4
 소비자상담: 031)494-5995

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는
 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 * 이 첨부문서 작성일(WA090202) 이후 변경된 내용은 소비자상담실로 문의하시면 확인할
 수 있습니다.