



치주질환 치료제

잇몸 발적, 부기, 출혈, 고름

이덴큐 캡슐

잇몸질환에는 치주농루(치주염)와 치은염이 있습니다. 이러한 잇몸질환은 여러 가지 원인에 의해 치아를 고정·유지·보호시켜 주는 치아주위조직(잇몸, 치근막, 치조골 등)에 염증이 발생하여 치실질을 할 때 출혈이 나타나거나 잇몸이 발적되고 입냄새 등의 증상이 나타나는 치은염으로 시작되어 부기, 출혈, 고름으로 이어져 나중에는 치아의 뿌리(치근)인 하부조직까지 염증상태가 확산되며, 심하면 치아가 흔들리고 빠져버리기도 하는 치주염을 일으킵니다. 이와 같은 잇몸질환은 잇몸에 대한 직접적인 자극(치석, 치태 등)이나 구강내 세균 및 전신적인 원인(비타민의 부족, 내분비 이상, 대사 이상 등)에 의해 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

이덴큐 캡슐은 잇몸의 증상을 정상화시키는 비타민 2종과 염증을 억제하는 리소짐 및 혈관을 강화하고 지혈작용을 하는 카르바조크롬을 적절히 배합한 잇몸질환 치료제입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(400mg) 중

염화리소짐(KPC)	30mg(역가)
카르바조크롬(KPC)	2mg
초산토코페롤 50%(KPC)	10mg
(토코페롤아세테이트로서 5.0 IU)	
제피아스코르브산(KPC)	156.3mg
(아스코르브산으로서 150mg)	
유당수화물(소 : 젖) 염화리소짐(달 : 난백)	

[성상]

얇은 주황색 가루가 든 상부, 하부 담청색의 경질캡슐

[효능·효과]

치은염, 치주농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

[용법·용량]

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2. 이상반응

- 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막만증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안종혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상양의 수종등의 증

의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오염을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐, 120캡슐, 240캡슐

※상기 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 이상반응이 나타날 수 있습니다.

※본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※이 첨부문서 작성일자(2009년 05월26일) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-554-2639)에서 확인할 수 있습니다.

0905

- 제조자: 청계제약(주)-경기도 화성시 양감면 대양리 1106-4
- 제조의뢰자: 한국슈넬제약(주)-경기도 안산시 단원구 목내동 448-2
- 판매자: (주)대웅생명과학-서울 강동구 성내1동 469-6